印刷日時： 2024-01-15 16:48:38

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称：頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法

レジメン説明：対象疾患：頭頸部癌
注意事項：初めて投与する場合は、初回レジメンを使用すること。

適用条件：白血球数3000/mm3、好中球数1500/mm3、血小板数70000/mm3以上、血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ1.2mg/dL以下、AST100U/L、ALT100U/L以下

除外条件：

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	中心静脈	危)ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液100mg(限定)	250mg/m2	275mg/m2
08	中心静脈	危)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注(10,25,50mg) 「ﾏﾙｺ	70mg/m2	77mg/m2
10	中心静脈	危)ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注 (250,1000mg)	700mg/m2	770mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	中心静脈	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 (6.6mg/2mL) [先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ] ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 (1.65mg/0.5mL) [先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶 2A 1瓶	09:45						
02	中心静脈	危)ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液100mg(限定) 大塚生食注 (250mL) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 1袋	10:00						
03	中心静脈	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:青	1瓶	11:00				16:30		
04	中心静脈 ＜次ページあり＞	危)KCL注20mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」 (20mL) 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 (1L) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射:	1KT 1A 1袋	11:15						

印刷日時： 2024-01-15 16:48:38

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称：頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		＊点滴時間 3時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白								
05	中心静脈	ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ点滴静注用150mg「NK」 生理食塩液「ﾋｶﾘ」 (100mLﾌﾟﾗ) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 30分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶 1瓶	14:15						
06	中心静脈	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎｳ」 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶 1瓶	14:45						
07	中心静脈	20%マンニットール注射液(300mL) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 30分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白 フィルター禁	1袋	15:00						
08	中心静脈	危)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注(10,25,50mg)「ﾏﾙｺ 大塚生食注 (500mL) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 90分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 300mL	15:30						
09	中心静脈	生理食塩液バッグ「ﾌｿｰ」 (1L) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1袋	17:00						
10	中心静脈 ＜次ページあり＞	危)ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注 (250,1000mg) 大塚生食注 (500mL) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法	0mg 1袋	17:30	17:30	17:30	17:30			

印刷日時： 2024-01-15 16:48:38

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称：頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		中心静脈注射: ＊点滴時間 24時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:青								
11	中心静脈	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 (6.6mg/2mL) [先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶 1瓶		09:45	09:45	09:45	09:45		
12	中心静脈	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 5分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:青 フラッシュ用	1瓶		1回	1回	1回			
01	処方	レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 分1 (1日1回) 1日分 ※ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ投与30分前に服用	5錠	●						
02	処方	レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 分1 (1日1回) 1日分 ※ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ投与30分前に服用	5錠							
03	処方	レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 分1 (1日1回) 1日分 ※ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ投与30分前に服用	5錠							
	＜次ページあり＞									

印刷日時： 2024-01-15 16:48:38

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称：頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	中心静脈	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液（6.6mg/2mL）［先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ］ ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液（1.65mg/0.5mL）［先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ］ 【ケモ専用】大塚生食注（50mL 袋） 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶 2A 1瓶							
02	中心静脈	危)ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液100mg(限定) 大塚生食注　(250mL) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 1袋	10:00						
03	中心静脈	【ケモ専用】大塚生食注（50mL 袋） 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:青	1瓶	11:00						
04	中心静脈	危)KCL注20mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」　(20mL) 硫酸Mg補正液1mEq/mL　20mL 生理食塩液バッグ「ﾌｿｰ」　(1L) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1KT 1A 1袋							
05	中心静脈	ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ点滴静注用150mg「NK」 生理食塩液「ﾋｶﾘ」　(100mLﾌﾟﾗ) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 30分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶 1瓶							
06	中心静脈 ＜次ページあり＞	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎｳ」 【ケモ専用】大塚生食注（50mL 袋） 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法	1瓶 1瓶							

印刷日時： 2024-01-15 16:48:38

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

耳鼻咽喉科　　レジメン名称：頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
		中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白								
07	中心静脈	20%マンニットール注射液(300mL) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 30分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白 フィルター禁	1袋							
08	中心静脈	危)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注(10,25,50mg)「ﾏﾙｺ 大塚生食注　(500mL) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 90分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 300mL							
09	中心静脈	生理食塩液バッグ「ﾌｿｰ」　(1L) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1袋							
10	中心静脈	危)ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注 (250,1000mg) 大塚生食注　(500mL) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 24時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:青	0mg 1袋							
11	中心静脈	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 (6.6mg/2mL) [先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶 1瓶	09:45						
12	中心静脈 ＜次ページあり＞	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法	1瓶							

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

耳鼻咽喉科　　レジメン名称：頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
		中心静脈注射: ＊点滴時間 5分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:青 フラッシュ用								
01	処方	レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 分1（1日1回）1日分 ※ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ投与30分前に服用	5錠							
02	処方	レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 分1（1日1回）1日分 ※ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ投与30分前に服用	5錠	●						
03	処方	レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 分1（1日1回）1日分 ※ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ投与30分前に服用	5錠							
	＜次ページあり＞									

印刷日時： 2024-01-15 16:48:38

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

耳鼻咽喉科　　レジメン名称：頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	中心静脈	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液（6.6mg/2mL）［先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ］ ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液（1.65mg/0.5mL）［先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ］ 【ケモ専用】大塚生食注（50mL 袋） 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶 2A 1瓶								
02	中心静脈	危)ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液100mg(限定) 大塚生食注　(250mL) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 1袋	10:00							
03	中心静脈	【ケモ専用】大塚生食注（50mL 袋） 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:青	1瓶	11:00							
04	中心静脈	危)KCL注20mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」　(20mL) 硫酸Mg補正液1mEq/mL　20mL 生理食塩液バッグ「ﾌｿｰ」　(1L) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1KT 1A 1袋								
05	中心静脈	ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ点滴静注用150mg「NK」 生理食塩液「ﾋｶﾘ」　(100mLﾌﾟﾗ) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 30分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶 1瓶								
06	中心静脈 ＜次ページあり＞	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎｳ」 【ケモ専用】大塚生食注（50mL 袋） 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法	1瓶 1瓶								

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

耳鼻咽喉科　　レジメン名称：頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
		中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白								
07	中心静脈	20%マンニットール注射液(300mL) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 30分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白 フィルター禁	1袋							
08	中心静脈	危)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注(10,25,50mg)「ﾏﾙｺ 大塚生食注　(500mL) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 90分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 300mL							
09	中心静脈	生理食塩液バッグ「ﾌｿｰ」　(1L) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1袋							
10	中心静脈	危)ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注 (250,1000mg) 大塚生食注　(500mL) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 24時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:青	0mg 1袋							
11	中心静脈	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 (6.6mg/2mL) [先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶 1瓶	09:45						
12	中心静脈 ＜次ページあり＞	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法	1瓶							

印刷日時： 2024-01-15 16:48:38

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

耳鼻咽喉科　　レジメン名称：頭頸部癌ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ+ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ+CDDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
		中心静脈注射: ＊点滴時間 5分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:青 フラッシュ用								
01	処方	レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 分1 (1日1回) 1日分 ※ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ投与30分前に服用	5錠							
02	処方	レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 分1 (1日1回) 1日分 ※ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ投与30分前に服用	5錠							
03	処方	レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 分1 (1日1回) 1日分 ※ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ投与30分前に服用	5錠	●						

RP	オーダーコメント
02	★ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ投与30分前にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠(10)5錠内服
12	※Day2～4のﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注のﾗｲﾝ交換時に実施