

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

腫瘍内科

レジメン名称 : 頭頸部癌 5-FU+CBDCA+^レム^ブロ^スマ^ブ療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		投与経路:CVルートメイン1:白								
04	中心静脈	危)カルボプラチン注(50, 150, 450mg)日医 大塚糖液5% (250mL) 療法名:頭頸部癌 5-FU+CBDCA+ ^レ ム ^ブ ロ ^ス マ ^ブ 療法 中心静脈注射: *点滴時間 60分で 投与経路:CVルートメイン1:白	0mg 1袋	11:00						
05	中心静脈	生理食塩液「ヒカリ」(50mLプー) 療法名:頭頸部癌 5-FU+CBDCA+ ^レ ム ^ブ ロ ^ス マ ^ブ 療法 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVルートメイン1:白	1瓶	12:00						
06	中心静脈	危)フルオウアシル注(250, 1000mg) 大塚生食注(500mL) 療法名:頭頸部癌 5-FU+CBDCA+ ^レ ム ^ブ ロ ^ス マ ^ブ 療法 中心静脈注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:CVルートメイン1:青	0mg 1袋	12:05	12:05	12:05	12:05			
07	中心静脈	生理食塩液「ヒカリ」(50mLプー) 療法名:頭頸部癌 5-FU+CBDCA+ ^レ ム ^ブ ロ ^ス マ ^ブ 療法 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVルートメイン1:青 フラッシュ用	1瓶					1回		
01	処方	アプレピタントカプセル(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※Day1カルボプラチン投与60-90分前、Day2-3朝食後	1セット	●						
02	処方	デカドロン錠 0.5mg 分2(朝,昼)食後 3日分	8錠		●	●	●			

RP	オーダーコメント
04	【アプレピタントカプセル】 1日目カルボプラチン投与60-90分前に内服。 2-3日目朝食後に内服。