インターバル日数： 14 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：4クール

乳腺外科　　レジメン名称：乳癌dose-denseEC療法

レジメン説明：対象疾患：乳癌の術前術後
アンスラサイクリン系薬剤未治療例で、本剤の総投与量900mg/m2を超えると、うっ血性心不全のリスクが増大する。
アンスラサイクリン系薬剤等、心毒性を有する薬剤による前治療歴のある患者は、心機能検査を行い慎重に投与すること。

適用条件：白血球数3000/mm3、好中球数1500/mm3、血小板数70000/mm3以上、血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ1.2mg/dL以下、AST100U/L、ALT100U/L以下
本ﾚｼﾞﾒﾝ4ｸｰﾙに引き続いて乳癌dose-denseﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ療法を行う。

除外条件：ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞとの同時併用は禁忌

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	中心静脈	危)ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ注(10,50mg)｢ｻﾜｲ｣	100mg/m2	110mg/m2
04	中心静脈	危)注射用エンドキサン500mg	600mg/m2	660mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	中心静脈	ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ点滴静注用150mg 「NK」 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣ (100mLﾌﾟﾗ) 療法名:乳癌dose-denseEC療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 30分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶 1瓶	10:00						
02	中心静脈	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL｢ﾀｲﾎｳ｣ ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 (6.6mg/2mL) [先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ] ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 (1.65mg/0.5mL) [先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:乳癌dose-denseEC療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶 1瓶 2A 1瓶	10:30						
03	中心静脈	危)ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ注(10,50mg)｢ｻﾜｲ｣ 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:乳癌dose-denseEC療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 1瓶	10:45						
04	中心静脈 ＜次ページあり＞	危)注射用エンドキサン500mg 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣ (100mLﾌﾟﾗ)	0mg 1瓶	11:00						

印刷日時： 2023-11-30 15:29:39

インターバル日数： 14 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：4クール

乳腺外科　　レジメン名称：乳癌dose-denseEC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		療法名:乳癌dose-denseEC療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 30分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白								
05	中心静脈	【ケモ専用】大塚生食注（50mL 袋） 療法名:乳癌dose-denseEC療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 5分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶	11:30						
06	ヘパロック	【10mL】ﾍﾊﾟNaﾛｯｸ用100単位/mL 療法名:乳癌dose-denseEC療法 ヘパロック: ポート	1筒	11:35						
07	皮下注	ジーラスタ皮下注3.6ｍｇ 療法名:乳癌dose-denseEC療法 皮下注射:ワンショット	1筒		15:00					
01	処方	デカドロン錠　４ｍｇ 分2 (朝,昼)食後 4日分	2錠		●	●	●	●		

RP	オーダーコメント
07	★Ｄａｙ２～4の範囲で変更可