

乳腺外科

レジメン名称 : 【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法

レジメン説明 : 対象患者 : 乳癌の術前 (TNBC)

適用条件 :

除外条件 :

使用する抗がん剤 :

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	中心静脈	危)キイトルダ 静注(20, 100mg) (限定)	200mg	200mg
05	中心静脈	危)パクリタセル注(30, 100mg) 「ホスピール」	80mg/m2	88mg/m2
06	中心静脈	危)カルボプラチン注(50, 150, 450mg) 日医	5(AUC)	750mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	中心静脈	危)キイトルダ 静注(20, 100mg) (限定) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名: 【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVルートメイン1:白 フィルターを通す	0mg 1瓶	10:05						
02	中心静脈	生理食塩液「ヒカリ」 (50mLブーラ) 療法名: 【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVルートメイン1:白 フラッシュ用	1瓶	10:35						
03	中心静脈	ホスアプレピタト点滴静注用150mg 「NK」 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名: 【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVルートメイン1:白	1瓶 1瓶	10:40						
04	中心静脈  <次ページあり>	パロセトン静注0.75mg/5mL 「タイホ」 デキスト注射液 (6.6mg/2mL) [先;デカトロン] ファモチジン静注20mg 「日新」 生理食塩液「ヒカリ」 (50mLブーラ) 療法名: 【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法	1瓶 1瓶 1管 1瓶	11:10						

乳腺外科

レジメン名称 : 【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		中心静脈注射: *点滴時間 15分で 投与経路:CVルートメイン1:白								
05	中心静脈	危)パ <sup>レ</sup> クリタセル注(30,100mg)「ホスピ <sup>ー</sup> ラ 大塚糖液5% (250mL) 療法名:【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法 中心静脈注射: *点滴時間 60分で 投与経路:CVルートメイン1:白 フィルターを通す	0mg 1袋	11:25						
06	中心静脈	危)カボ <sup>ラ</sup> チン注(50,150,450mg)日医 大塚糖液5% (250mL) 療法名:【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法 中心静脈注射: *点滴時間 60分で 投与経路:CVルートメイン1:白	0mg 1袋	12:25						
07	中心静脈	生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラ) 療法名:【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVルートメイン1:白 フラッシュ用	1瓶	13:25						
08	へパロック	【10mL】へ <sup>パ</sup> Na <sup>ク</sup> ック用100単位/mL 療法名:【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法 へパロック: ポート	1筒	13:30						
09	中心静脈	デ <sup>キ</sup> ト注射液(6.6mg/2mL)[先;デ <sup>カ</sup> ト <sup>ン</sup> ] ファモチジン静注20mg「日新」 生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラ) 療法名:【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法 中心静脈注射: *点滴時間 15分で 投与経路:CVルートメイン1:白	1瓶 1管 1瓶							
01	処方 <次ページあり>	デカドロン錠 4mg	1錠		●	●	●			









乳腺外科

レジメン名称 : 【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
06	中心静脈	危)カボ <sup>®</sup> チン注(50, 150, 450mg)日医 大塚糖液5% (250mL) 療法名:【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法 中心静脈注射: *点滴時間 60分で 投与経路:CVルートメイン1:白	0mg 1袋							
07	中心静脈	生理食塩液「ヒカリ」(50mL <sup>®</sup> ラ) 療法名:【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVルートメイン1:白 フラッシュ用	1瓶	11:15						
08	へパロック	【10mL】へ <sup>®</sup> Na <sup>®</sup> ック用100単位/mL 療法名:【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法 へパロック: ポート	1筒	11:20						
09	中心静脈	デ <sup>®</sup> キート注射液(6.6mg/2mL)[先;デ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ン] ファモチジン静注20mg「日新」 生理食塩液「ヒカリ」(50mL <sup>®</sup> ラ) 療法名:【術前】乳癌 TC+Pembrolizumab療法 中心静脈注射: *点滴時間 15分で 投与経路:CVルートメイン1:白	1瓶 1管 1瓶	10:00						
01	処方	デカドロン錠 4mg 分1(朝)食後 3日分	1錠							

RP	オーダーコメント
05	Day1、8、15はパクリタキセル投与30分前に、レスタミン錠(10)5錠内服する。