

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 乳癌CBDCA+Gem+ペムボロシマブ療法 (q3w)

レジメン説明 : PD-L1陽性のHER2陰性の手術不能または再発乳癌に対する一次療法。

適用条件 : PD-L1陽性のHER2陰性の手術不能または再発乳癌に対する一次療法。

白血球数3000/mm<sup>3</sup>、好中球数1500/mm<sup>3</sup>、血小板数70000/mm<sup>3</sup>以上、血清クレアチニン1.2mg/dL以下、AST100U/L、ALT100U/L以下

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	危)キイトルダ 静注(20, 100mg) (限定)	200mg	200mg
04	点滴静注(末梢)	ゲムシタビン注 (1g, 200mg)	1000mg/m <sup>2</sup>	1100mg/m <sup>2</sup>
05	点滴静注(末梢)	危)カルボプラチン注(50, 150, 450mg) 日医	2 (AUC)	2.2 (AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注(末梢)	危)キイトルダ 静注(20, 100mg) (限定) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLプラ) 療法名:乳癌CBDCA+Gem+ペムボロシマブ療法 (q3w) 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	10:15						
02	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mLプラ) 療法名:乳癌CBDCA+Gem+ペムボロシマブ療法 (q3w) 点滴静注(末梢): *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:45						
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mLプラ) グラセトン静注液1mgシリンジ「サワイ」 デキスト注射液 (6.6mg/2mL) [先;デカトン] 療法名:乳癌CBDCA+Gem+ペムボロシマブ療法 (q3w) 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1筒 1瓶	10:55						
04	点滴静注(末梢)  <次ページあり>	ゲムシタビン注 (1g, 200mg) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLプラ) 療法名:乳癌CBDCA+Gem+ペムボロシマブ療法 (q3w)	0mg 100mL	11:10						



共通

レジメン名称 : 乳癌CBDCA+Gem+ペニシリン療法 (q3w)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴静注(末梢)	危)キイトルダ 静注(20, 100mg) (限定) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLプラ) 療法名:乳癌CBDCA+Gem+ペニシリン療法 (q3w) 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶							
02	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mLプラ) 療法名:乳癌CBDCA+Gem+ペニシリン療法 (q3w) 点滴静注(末梢): *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mLプラ) グラセトン静注液1mgシリンジ「サライ」 デキスト注射液 (6.6mg/2mL) [先 ; デキスト] 療法名:乳癌CBDCA+Gem+ペニシリン療法 (q3w) 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1筒 1瓶	10:15						
04	点滴静注(末梢)	ゲムシタビン注 (1g, 200mg) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLプラ) 療法名:乳癌CBDCA+Gem+ペニシリン療法 (q3w) 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 100mL	10:30						
05	点滴静注(末梢)	危)カルボプラチン注(50, 150, 450mg) 日医 大塚糖液5% (250mL) 療法名:乳癌CBDCA+Gem+ペニシリン療法 (q3w) 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	11:00						
06	点滴静注(末梢)  <次ページあり>	生理食塩液「ヒカリ」 (50mLプラ) 療法名:乳癌CBDCA+Gem+ペニシリン療法 (q3w) 点滴静注(末梢):	1瓶	12:00						

