

乳腺外科

レジメン名称 : 乳癌Pembrolizumab (6週毎)

レジメン説明 : 対象疾患 : 乳癌術後

\* 1回400mgを6週間隔で投与。術後に5コース投与。

慎重投与 : 添付文書参照

適用条件 :

除外条件 :

使用する抗がん剤 :

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	危)キイトルーダ <sup>®</sup> 静注(20, 100mg) (限定)	400mg	400mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	危)キイトルーダ <sup>®</sup> 静注(20, 100mg) (限定) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mL <sup>®</sup> ラ) 療法名:乳癌Pembrolizumab (6週毎) 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mL <sup>®</sup> ラ) 療法名:乳癌Pembrolizumab (6週毎) 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:30						