

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

呼吸器外科

レジメン名称 : 肺癌Atezolizumab +CBDCA +PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4			
		投与経路:末梢ルートメイン1								
04	点滴静注(末梢)	ペムセツ注 (100, 500, 800mg) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名:肺癌Atezolizumab +CBDCA +PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 100mL	11:20						
05	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名:肺癌Atezolizumab +CBDCA +PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	11:30						
06	点滴静注(末梢)	危)カボプラチン注(50, 150, 450mg)日医 大塚糖液5% (250mL) 療法名:肺癌Atezolizumab +CBDCA +PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	12:00						
07	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Atezolizumab +CBDCA +PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	13:00						
01	処方	アプレタクトカプセルセット(3日分/個) (内服全量) 医師の指示通り ※1日目カボプラチン投与60-90分前2,3日目朝食後	1セット	●						
02	処方	デカドロン錠 4mg 分1(朝)食後 3日分	1錠		●	●	●			

RP	オーダーコメント
01	初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降投与時間は30分に短縮
04	副作用軽減のための注意事項 初回投与7日前から葉酸(パルビタン末 1g 1x1 連日経口投与)、ビタミンB12(メチコバル1mg筋注 以降9週毎=3コース毎)を投与すること。 <次ページあり>

インターバル日数：21 日

基準日：Day 1

最大クール数：6クール

呼吸器外科

レジメン名称：肺癌Atezolizumab +CBDCA +PEM

RP	オーダーコメント
----	----------