

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器外科

レジメン名称 : 肺癌Atezolizumab +PEM維持療法

レジメン説明 : 化学療法未治療の扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発非小細胞肺癌

適用条件 : 慎重投与 : 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のある患者間質性肺炎のある患者又はその既往歴のある患者

導入療法 : 4又は6コース、それ以降はアテゾリズマブ+PEMの維持療法を継続 (維持療法はPDまで実施)

適応条件 ; WBC 3000/mm<sup>2</sup>、Neu 1500/mm<sup>3</sup>、Plt 75000/mm<sup>3</sup>以上、血清クレアチニン 1.5mg/dL以下、AST 100U/L、ALT 100U/L以下

IR出現時は適切な処置を行うとともに、次回から抗ヒスタミン薬やステロイドの使用を検討する

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	危)テセントリク点滴静注1200mg(限定)	1200mg	1200mg
04	点滴静注(末梢)	ペムトレキド注 (100, 500, 800mg)	500mg/m <sup>2</sup>	550mg/m <sup>2</sup>

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	危)テセントリク点滴静注1200mg(限定) 大塚生食注 (250mL) 療法名:肺癌Atezolizumab +PEM維持療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1袋	10:00						
02	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Atezolizumab +PEM維持療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	11:00						
03	点滴静注(末梢)	デキスト注射液 (6.6mg/2mL) [先 ; デキスト] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Atezolizumab +PEM維持療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶	11:05						
04	点滴静注(末梢) <次ページあり>	ペムトレキド注 (100, 500, 800mg)	0mg	11:20						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器外科

レジメン名称 : 肺癌Atezolizumab +PEM維持療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
		生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブ <sup>ラ</sup> ) 療法名:肺癌Atezolizumab +PEM維持療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL							
05	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Atezolizumab +PEM維持療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	11:30						

RP	オーダーコメント
01	初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分に短縮
04	副作用軽減のための注意事項 初回投与7日前から楊さん(パルビ <sup>タ</sup> 末 1g 1x1 連日経口投与)、ビタミンB12 (メコバ <sup>ル</sup> 1mg筋注 以降9週 毎=3コース毎)を投与すること。