

共通 【小細胞肺癌】 レジメン名称 : 肺癌CBDCA+ETP+Durvalumab

- レジメン説明 :
- ・4コース施行後、D-mab単独の維持療法に移行
  - ・D-mabはインラインフィルター使用し、ETPはインラインフィルター用いず投与
  - ・Bw30kg以下の場合、D-mab20mg/kg
  - ・CBDCAはAUC5、AUC6で投与可
  - ・IR出現時は適切な処置を行い、次回から抗ヒスタミン薬、ステロイドを検討する

適用条件 : 進展型小細胞肺癌が対象

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	危)イフィゾ <sup>®</sup> (120, 500mg) (限定)	1500mg	1500mg
04	点滴静注(末梢)	エト <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> 注100mg 「サト <sup>®</sup> 」	100mg/m <sup>2</sup>	110mg/m <sup>2</sup>
05	点滴静注(末梢)	危)カボ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> ラチ <sup>®</sup> 注(50, 150, 450mg) 日医	5 (AUC)	6 (AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴静注(末梢)	危)イフィゾ <sup>®</sup> (120, 500mg) (限定) 大塚生食注 (250mL) 療法名: 肺癌CBDCA+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢ルートメイン 1 フィルターを通す	0mg 1袋	10:00						
02	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名: 肺癌CBDCA+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路: 末梢ルートメイン 1	1瓶	11:00						
03	点滴静注(末梢)	グ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 静注液1mg/シ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 「サ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> 」 デ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> 注射液 (1.65mg/0.5mL) [先 ; デ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ン] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名: 肺癌CBDCA+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路: 末梢ルートメイン 1	1筒 2A 1瓶	11:05						
04	点滴静注(末梢) <次ページあり>	エト <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> 注100mg 「サト <sup>®</sup> 」	0mg	11:20	10:15	10:15				

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 4クール

共通

【小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌CBDCA+ETP+Durvalumab

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
		大塚糖液5% (500mL) 療法名:肺癌CBDCA+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通さない	1袋							
05	点滴静注(末梢)	危カボ <sup>®</sup> チン注(50, 150, 450mg)日医 大塚糖液5% (250mL) 療法名:肺癌CBDCA+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	13:20						
06	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌CBDCA+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	14:20	12:15	12:15				
07	点滴静注(末梢)	デキ <sup>®</sup> ト注射液 (1.65mg/0.5mL) [先 ; デカ <sup>®</sup> ロ] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌CBDCA+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2A 1瓶		10:00	10:00				
01	処方	アプレ <sup>®</sup> タトカ <sup>®</sup> セルセット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※1日目CBDCA投与60~90分前、2,3日目朝食後	1セット	●						

RP	オーダーコメント
05	・アプレ <sup>®</sup> タトカ <sup>®</sup> 服用タイミング 1日目 ; CBDCA投与60~90分前 2、3日目 ; 朝食後