

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

共通

レジメン名称 : 肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab

レジメン説明 : 対象疾患 : 非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)

注意事項 : アブラキサンは、人血清アルブミンにパクリタセルを結合させ、ナノ粒子化した製剤である。また、特定生物由来製剤に該当するため、説明及び承諾書が必要

導入療法は4又は6コース、それ以降はアテゾリズマブ単独の維持療法を継続。

適用条件 : 白血球数3000/mm3、好中球数1000/mm3、血小板数75000/mm3以上、血清クレアチニン1.5mg/dL以下、AST100U/L、ALT100U/L以下

除外条件 : ①重篤な骨髄抑制のある患者②感染症を合併している患者③本剤又はパクリタセル、アルブミンに対し過敏症の既往歴のある患者④妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴静注(末梢)	危)テセントリク点滴静注1200mg(限定)	1200mg	1200mg
04	点滴静注(末梢)	危)アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/m2	110mg/m2
06	点滴静注(末梢)	危)カルボプラチン注(50, 150, 450mg)日医	6 (AUC)	900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注(末梢)	グラセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」 デキスト注射液(1.65mg/0.5mL) [先 ; デキスト] 生理食塩液「ヒカリ」(50mLブヲ) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 2A 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	危)テセントリク点滴静注1200mg(限定) 大塚生食注(250mL) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1袋	10:15						
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(50mLブヲ) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	11:15						
04	点滴静注(末梢) <次ページあり>	危)アブラキサン点滴静注用100mg	0mg	11:30						



共通

レジメン名称 : 肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注(末梢)	ゲラネトロン静注液1mg/10mL 「サリ」 デキスト注射液 (1.65mg/0.5mL) [先 ; デキスト] 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL プラ) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 2A 1瓶							
02	点滴静注(末梢)	危)テセントリク点滴静注1200mg(限定) 大塚生食注 (250mL) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1袋							
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mL プラ) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
04	点滴静注(末梢)	危)アブラキソ点滴静注用100mg 生理食塩液「ヒカリ」 (100mL プラ) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 【禁】 フィルター通さない	0mg 20mL	10:15						
05	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mL プラ) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:45						
06	点滴静注(末梢)  <次ページあり>	危)カボプロチン注(50, 150, 450mg) 日医 大塚糖液5% (250mL) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab	0mg 1袋							



共通

レジメン名称 : 肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴静注(末梢)	ゲラネトロン静注液1mg/100μg 「サリ」 デキスト注射液 (1.65mg/0.5mL) [先 ; デキスト] 生理食塩液「ヒカリ」 (50mLブヲ) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 2A 1瓶							
02	点滴静注(末梢)	危)テセントリク点滴静注1200mg(限定) 大塚生食注 (250mL) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1袋							
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mLブヲ) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
04	点滴静注(末梢)	危)アブラキソ点滴静注用100mg 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブヲ) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 【禁】 フィルター通さない	0mg 20mL	10:15						
05	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mLブヲ) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:45						
06	点滴静注(末梢)  <次ページあり>	危)カボプラン注(50, 150, 450mg) 日医 大塚糖液5% (250mL) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab	0mg 1袋							

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

共通

レジメン名称 : 肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
		点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1								
07	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラ) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
08	点滴静注(末梢)	デキスト注射液(6.6mg/2mL)[先;デカト] 生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラ) 療法名:肺癌CBDCA+nab PTX+Atezolizumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶	10:00						
01	処方	アプレタトカプセル錠(3日分/個) (内服全量)1日1回 医師の指示通り ※1日目はカボプラチン投与60-90分前2,3日目朝食後	1セット							
02	処方	デカドロン錠 0.5mg 分2(朝,昼)食後3日分	8錠							

RP	オーダーコメント
02	★テセントリクは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分に短縮することができる。
04	★テセントリクはインラインフィルターを通して投与する。
06	★アブラキサンはフィルターを通さないで投与する。
06	★アプレタトカプセル錠(3日分/個)、1日1回内服、1日目はカボプラチン投与60~90分前、2日目と3日目は朝食後に内服すること