

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 4クール

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌CDDP+GEM+Necitumumab

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1								
05	点滴静注(末梢)	ゲムシタビン注 (1g, 200mg) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mL プラ) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 100mL	14:25						
06	点滴静注(末梢)	20%マンニトール注射液(300mL) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター禁	1袋	15:00						
07	点滴静注(末梢)	危)シプ ラチン注 (10, 25, 50mg) 「マルコ 大塚生食注 (500mL) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 300mL	15:30						
08	点滴静注(末梢)	生理食塩液バッグ「フー」 (1L) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	17:00						
09	点滴静注(末梢)	デキアト注射液 (6.6mg/2mL) [先; デカト]] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶							
01	処方 <次ページあり>	アプレミタトカプセルセット (3日分/個) (内服全量) 1日1回	1セット	●						

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌CDDP+GEM+Necitumumab

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:00 11:05 11:55						
02	点滴静注(末梢)	危)ポートラザ点滴静注800mg(限定) 大塚生食注 (250mL) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL	10:05						
03	点滴静注(末梢)	危)KCL注20mEqキット「テルモ」 (20mL) 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 生理食塩液バッグ「フソー」 (1L) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1KT 1A 1袋							
04	点滴静注(末梢)	パロセトン静注0.75mg/5mL「タイホ」 デキスト注射液 (6.6mg/2mL) [先;デカトン] デキスト注射液 (1.65mg/0.5mL) [先;デカトン] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶 2A 1瓶							
05	点滴静注(末梢)	ゲムシタヒン注 (1g, 200mg) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mL プラ) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 100mL	11:25						
06	点滴静注(末梢) <次ページあり>	20%マンニトール注射液(300mL) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab	1袋							

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌CDDP+GEM+Necitumumab

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
		点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター禁								
07	点滴静注(末梢)	危)シプ ラチン注(10, 25, 50mg) 「マルコ 大塚生食注 (500mL) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 300mL							
08	点滴静注(末梢)	生理食塩液バッグ「フー」 (1L) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
09	点滴静注(末梢)	デキアト注射液 (6.6mg/2mL) [先;デカト] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌CDDP+GEM+Necitumumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶	11:10						
01	処方	アプレピ タントカプセルセット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※初日シプ ラチン投与60-90分前、2・3日目朝食後	1セット							
02	処方	デカドロン錠 4 m g 分2 (朝, 昼)食後 4日分	2錠							

RP	オーダーコメント
02	☆ポートラーザを400mgへ減量して使用する場合、生食200mLに溶解し、投与すること。