

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す								
05	点滴静注(末梢)	ゲラネトロン静注液1mg/20mL 「サリ」 デキスト注射液 (1.65mg/0.5mL) [先 ; デキスト] デキスト注射液 (6.6mg/2mL) [先 ; デキスト] ファモチジン静注20mg 「日新」 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 1A 1瓶 1管 1瓶	11:45						
06	点滴静注(末梢)	危)パクリタセル注(30,100mg)「ホスピラ」 大塚糖液5% (500mL) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1袋	12:00						
07	点滴静注(末梢)	危)カルボプラチン注(50,150,450mg) 大塚糖液5% (250mL) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	15:00						
08	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	16:00						
01	処方	レスタミンコーワ錠 10mg 頓服:1回分,医師の指示通り ※パクリタセル投与30分前に内服	5錠	●						
02	処方 <次ページあり>	アプレピタリカブセルセット(3日分/個)	1セット	●						

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
02	点滴静注(末梢)	危)オプジーボ点滴静注120mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶							
03	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
04	点滴静注(末梢)	危)ヤボイ点滴静注液50mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶							
05	点滴静注(末梢)	グレンセト静注液1mgシリンジ「サワイ」 デキスト注射液(1.65mg/0.5mL) [先;デカトロン] デキスト注射液(6.6mg/2mL) [先;デカトロン] ファモチジン静注20mg「日新」 【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 1A 1瓶 1管 1瓶							
06	点滴静注(末梢) <次ページあり>	危)パクリタセル注(30,100mg)「ホステーラ	0mg							

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
		大塚糖液5% (500mL) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	1袋							
07	点滴静注(末梢)	危)カボプレン注(50, 150, 450mg) 大塚糖液5% (250mL) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
08	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
01	処方	レスタミンコーワ錠 10mg 頓服:1回分, 医師の指示通り ※パクリタキセル投与30分前に内服	5錠							
02	処方	アプレタクトカプセルセット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※1日目はCBDCA投与60~90分前に内服	1セット							
03	処方	デカドロン錠 0.5mg 分2(朝, 昼)食後 3日分	8錠							
04	処方	レスタミンコーワ錠 10mg 頓服:1回分, 医師の指示通り ※パクリタキセル投与30分前に内服	5錠							
05	処方	アプレタクトカプセルセット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※1日目はCBDCA投与60~90分前に内服	1セット							
06	処方 <次ページあり>	デカドロン錠 0.5mg	8錠							

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
02	点滴静注(末梢)	危)オプジーボ点滴静注120mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶							
03	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
04	点滴静注(末梢)	危)ヤボイ点滴静注液50mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶							
05	点滴静注(末梢)	グレンセト静注液1mgシリンジ「サワイ」 デキスト注射液(1.65mg/0.5mL) [先;デカトロン] デキスト注射液(6.6mg/2mL) [先;デカトロン] ファモチジン静注20mg「日新」 【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 1A 1瓶 1管 1瓶							
06	点滴静注(末梢) <次ページあり>	危)パクリタセル注(30,100mg)「ホスピラ	0mg							

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
		大塚糖液5% (500mL) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	1袋							
07	点滴静注(末梢)	危)カボプレン注(50, 150, 450mg) 大塚糖液5% (250mL) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
08	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
01	処方	レスタミンコーワ錠 10mg 頓服:1回分, 医師の指示通り ※パクリタキセル投与30分前に内服	5錠							
02	処方	アプレタクトカプセルセット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※1日目はCBDCA投与60~90分前に内服	1セット							
03	処方	デカドロン錠 0.5mg 分2(朝, 昼)食後 3日分	8錠							
04	処方	レスタミンコーワ錠 10mg 頓服:1回分, 医師の指示通り ※パクリタキセル投与30分前に内服	5錠							
05	処方	アプレタクトカプセルセット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※1日目はCBDCA投与60~90分前に内服	1セット							
06	処方 <次ページあり>	デカドロン錠 0.5mg	8錠							

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25			
01	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	危)オプジーボ点滴静注120mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	10:15						
03	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
04	点滴静注(末梢)	危)ヤボイ点滴静注液50mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶							
05	点滴静注(末梢)	グレンセト静注液1mgシリンジ「サライ」 デキスト注射液(1.65mg/0.5mL) [先;デカトロン] デキスト注射液(6.6mg/2mL) [先;デカトロン] ファモチジン静注20mg「日新」 【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 1A 1瓶 1管 1瓶	10:45						
06	点滴静注(末梢) <次ページあり>	危)パクリタセル注(30,100mg)「ホステーラ	0mg	11:00						

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25			
		大塚糖液5% (500mL) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	1袋							
07	点滴静注(末梢)	危)カボプレン注(50, 150, 450mg) 大塚糖液5% (250mL) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	14:00						
08	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	15:00						
01	処方	レスタミンコーワ錠 10mg 頓服:1回分, 医師の指示通り ※パクリタキセル投与30分前に内服	5錠							
02	処方	アプレタクトカプセルセット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※1日目はCBDCA投与60~90分前に内服	1セット							
03	処方	デカドロン錠 0.5mg 分2(朝, 昼)食後 3日分	8錠							
04	処方	レスタミンコーワ錠 10mg 頓服:1回分, 医師の指示通り ※パクリタキセル投与30分前に内服	5錠	●						
05	処方	アプレタクトカプセルセット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※1日目はCBDCA投与60~90分前に内服	1セット	●						
06	処方 <次ページあり>	デカドロン錠 0.5mg	8錠		●	●	●			

