













インターバル日数 : 42 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 2クール

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM

| RP | 手技                       | 薬剤名称   | 用量/単位           | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 |
|----|--------------------------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 点滴静注(末梢)                 | 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)<br>療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 15分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1   | 1瓶              |       |       |       |       |       |       |       |
| 02 | 点滴静注(末梢)                 | 危)オプジーボ点滴静注120mg(限定)<br>【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)<br>療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1<br>フィルターを通す               | 0mg<br>1瓶       |       |       |       |       |       |       |       |
| 03 | 点滴静注(末梢)                 | 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)<br>療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1   | 1瓶              |       |       |       |       |       |       |       |
| 04 | 点滴静注(末梢)                 | 危)ヤボイ点滴静注液50mg(限定)<br>【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)<br>療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1<br>フィルターを通す                 | 0mg<br>1瓶       |       |       |       |       |       |       |       |
| 05 | 点滴静注(末梢)                 | 危)KCL注20mEqキット「テルモ」 (20mL)<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL<br>生理食塩液バッグ「フジ」 (1L)<br>療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 3時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン1 | 1KT<br>1A<br>1袋 |       |       |       |       |       |       |       |
| 06 | 点滴静注(末梢)<br><br><次ページあり> | パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」<br>デキスト注射液 (1.65mg/0.5mL) [先;デカトロン]<br>デキスト注射液 (6.6mg/2mL) [先;デカトロン]   | 1瓶<br>2A<br>1瓶  |       |       |       |       |       |       |       |







インターバル日数 : 42 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 2クール

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM

| RP | 手技                       | 薬剤名称   | 用量/単位           | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 |  |  |
|----|--------------------------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 01 | 点滴静注(末梢)                 | 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)<br>療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 15分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1   | 1瓶              | 10:00 |       |       |       |       |  |  |
| 02 | 点滴静注(末梢)                 | 危)オプジーボ点滴静注120mg(限定)<br>【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)<br>療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1<br>フィルターを通す               | 0mg<br>1瓶       | 10:15 |       |       |       |       |  |  |
| 03 | 点滴静注(末梢)                 | 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)<br>療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1   | 1瓶              |       |       |       |       |       |  |  |
| 04 | 点滴静注(末梢)                 | 危)ヤボイ点滴静注液50mg(限定)<br>【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)<br>療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1<br>フィルターを通す                 | 0mg<br>1瓶       |       |       |       |       |       |  |  |
| 05 | 点滴静注(末梢)                 | 危)KCL注20mEqキット「テルモ」 (20mL)<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL<br>生理食塩液バッグ「フジ」 (1L)<br>療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 3時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン1 | 1KT<br>1A<br>1袋 | 10:45 |       |       |       |       |  |  |
| 06 | 点滴静注(末梢)<br><br><次ページあり> | パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」<br>デキスト注射液 (1.65mg/0.5mL) [先;デカトロン]<br>デキスト注射液 (6.6mg/2mL) [先;デカトロン]   | 1瓶<br>2A<br>1瓶  | 13:45 |       |       |       |       |  |  |



インターバル日数 : 42 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 2クール

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM

| RP | 手技 | 薬剤名称   | 用量/単位 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 |  |  |
|----|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 03 | 処方 | アプレミタカプセル錠(3日分/個)<br>(内服全量) 1日1回<br>医師の指示通り<br>※1日目はCDDP投与60~90分前に内服 | 1セット  | ●     |       |       |       |       |  |  |
| 04 | 処方 | デカドロン錠 0.5mg<br>分2 (朝, 昼) 食後 4日分                                     | 16錠   |       | ●     | ●     | ●     | ●     |  |  |