

共通 【非小細胞肺癌】 レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab q6w + Nivolumab q3w

レジメン説明 : 対象疾患 : 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

\* べリムマブは1mg/kgで6週間隔、ニボルマブは360mg/bodyで3週間隔で投与する。

慎重投与 : 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発自己免疫疾患の既往のある患者。間質性肺炎のある患者又はその既往歴のある患者

適用条件 : 白血球数2000/mm<sup>3</sup>, 好中球数1500/mm<sup>3</sup>, 血小板数100000/mm<sup>3</sup>, ヘモグロビン9.0g/dL以上、血清クレアチニン2.0mg/dL以下、AST100U/L、ALT100U/L以下  
インフュージョンリアクション出現時は適切な処置を行うとともに、次回から抗ヒスタミン薬やステロイドの使用を検討する。

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	危) オプジーボ 点滴静注120mg(限定)	360mg	360mg
03	点滴静注(末梢)	危) ヤボイ 点滴静注液50mg(限定)	1mg/kg	1.1mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注(末梢)	危) オプジーボ 点滴静注120mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab q6w + Nivolumab q3w 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab q6w + Nivolumab q3w 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:30						
03	点滴静注(末梢)	危) ヤボイ 点滴静注液50mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab q6w + Nivolumab q3w 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	11:00						
04	点滴静注(末梢) <次ページあり>	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)	1瓶	11:30						







共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab q6w + Nivolumab q3w

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
01	点滴静注(末梢)	危) オプジーボ 点滴静注120mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab q6w + Nivolumab q3w 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab q6w + Nivolumab q3w 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:30						
03	点滴静注(末梢)	危) ヤホイ点滴静注液50mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab q6w + Nivolumab q3w 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶							
04	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab q6w + Nivolumab q3w 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							

RP	オーダーコメント
01	★先にオプジーボを投与し、投与完了後30分以上間隔を空けてヤホイを投与する。 ★化°リムマブ(ヤホイ)は1mg/kgで6週間隔、ニボルマブ(オプジーボ)は360mg/bodyで3週間隔で投与する。