Page:1/3 期間:Day1~Day5 印刷日時: 2024-01-15 16:59:42

インターバル日数: 21 日 **基準日:** Day 1

最大クール数:6クール

共通 レジメン名称:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15) 【呼吸器】

レジメン説明:対象疾患:非小細胞肺癌 1サイクル:3週*4-6サイクル

副作用軽減のための注意事項:初回投与7日前から葉酸(パンビタン末1g 1x1 連日経口投与)、ビタミンB12(メチコバール1mg筋注 以降9週毎=3コース毎)を投与すること。

Day3

Day5

Day4

適用条件:白血球数3000/mm3、好中球数1500/mm3、血小板数70000/mm3以上、血清クレアチニン1.2mg/dL以下、AST100U/L、ALT100U/L以下

除外条件:

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値			
02	点滴静注(末梢)	危)アバスチン点滴静注用(100,400mg)(限定) 15mg/kg 16.5mg/kg					
07	点滴静注(末梢)	(末梢) へ。メトレキセト、注 (100,500,800mg) 500mg/m2 550mg/m2					
09	点滴静注(末梢)	危)シスプラチン注(10, 25, 50mg) 「マルコ	75 mg/m2	82.5mg/m2			
RP	手技	薬剤名称	用量/単位 Day	1 Day2	Da		

01	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋)	1瓶	09:00			
		療法名:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15)					
		点滴静注(末梢):					
		*点滴時間 5分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
02	点滴静注(末梢)	危)アバスチン点滴静注用(100,400mg)(限定)	Omg	09:05			
		生理食塩液「ヒカリ」(100mLプラ)	1瓶				
		療法名:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15)					
		点滴静注(末梢):					
		*点滴時間 90分で					
		投与経路:末梢ルートメイン 1					
03	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)	1瓶	10:35			
		療法名:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15)					
		点滴静注(末梢):					
		*点滴時間 5分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
04	点滴静注(末梢)	危)KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL)	1KT	10:40			
		硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	1A				
		生理食塩液バッグ「フソー」(1L)	1袋				
		療法名:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15)					
		点滴静注(末梢):					
	<次ページあり>						

期間:Day1~Day5

Page :2/3

共通

印刷日時: 2024-01-15 16:59:42

最大クール数:6クール

基準日: Day 1 インターバル日数: 21 日

【呼吸器】 レジメン名称:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	
		*点滴時間 3時間で							
		投与経路:末梢ルートメイン1							
05	点滴静注(末梢)	ホススアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	1瓶	13:40					
		生理食塩液「ヒカリ」(100mLプラ)	1瓶						
		療法名:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15)							
		点滴静注(末梢):							
		*点滴時間 30分で							
		投与経路:末梢ルートメイン 1							
06	点滴静注(末梢)	n° ロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	1瓶	14:10					
		デキサート注射液 (6.6mg/2mL) [先;デカトロン]	1瓶						
		デキサート注射液(1.65mg/0.5mL)[先;デカトロン]	2A						
		【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)	1瓶						
		療法名:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15)							
		点滴静注(末梢):							
		*点滴時間 15分で							
		投与経路:末梢ルートメイン 1							
07	点滴静注(末梢)	^゚メトレキセド注 (100, 500, 800mg)	Omg	14:25					
		生理食塩液「ヒカリ」(100mLプラ)	100mL						
		療法名:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15)							
		点滴静注(末梢):							
		*点滴時間 10分で							
		投与経路:末梢ルートメイン1							
08	点滴静注(末梢)	20%マンニットール注射液(300mL)	1袋	14:35					
		療法名:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15)							
		点滴静注(末梢):							
		*点滴時間 30分で							
		投与経路:末梢ルートメイン1							
		フィルター禁							
09	点滴静注(末梢)	危)シスプ ラチン注 (10, 25, 50mg) 「マルコ	Omg	15:05					
		大塚生食注 (500mL)	300mL						
		療法名:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15)							
		点滴静注(末梢):							
		*点滴時間 90分で							
		投与経路:末梢ルートメイン1							
	<次ページあり>								

期間: Day1~Day5 印刷日時: 2024-01-15 16:59:42

インターバル日数: 21 日 基準日: Day 1

最大クール数:6クール

共通 【呼吸器】 レジメン名称:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15)

Page :3/3

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	
10		生理食塩液バッグ「フソー」(1L) 療法名:肺癌CDDP+PEM+Bevacizumab(15)	1袋	16:35					
		点滴静注(末梢):							
		*点滴時間 3時間で							
		投与経路:末梢ルートメイン 1							
01	処方	デカドロン錠 4mg	2錠			•	•	•	
		分2 (朝,昼)食後 4日分							

RP	オーダーコメント
02	*初回投与時は90分かけて点滴静注する。
	*忍容性が良好であれば、2回目60分、3回目以降30分で点滴静注することができる。