インターバル日数： 14 日　　**基準日：** Day 1　　**最大クール数：**0クール

共通　　【大腸】　　**レジメン名称：**大腸癌ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ療法

レジメン説明：対象疾患：大腸癌

適用条件：白血球数3000/mm3、好中球数1500/mm3、血小板数75000/mm3以上、血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ1.2mg/dL以下、AST100U/L、ALT100U/L以下

除外条件：

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	中心静脈	危)ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ注(100,400mg)(限定)	6mg/kg	6.6mg/kg
04	中心静脈	危)ｲﾘﾉﾃｶﾝ注「ﾄｰﾜ」(40,100mg)	150mg/m2	165mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	中心静脈	危)ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ注(100,400mg)(限定) 生理食塩液「ﾋｶﾘ」 (100mLﾌﾟﾗ) 療法名:大腸癌ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白 フィルターを通す	0mg 1瓶	11:45						
02	中心静脈	生理食塩液「ﾋｶﾘ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:大腸癌ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶	12:45						
03	中心静脈	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ静注液3mgｼﾘﾝｼﾞ「NK」 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 (6.6mg/2mL) [先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ] 生理食塩液「ﾋｶﾘ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:大腸癌ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1筒 1瓶 1瓶	13:00						
04	中心静脈	危)ｲﾘﾉﾃｶﾝ注「ﾄｰﾜ」(40,100mg) 大塚糖液5% (250mL) 療法名:大腸癌ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 1袋	13:15						
05	中心静脈	生理食塩液「ﾋｶﾘ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:大腸癌ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ療法 中心静脈注射: ＊点滴時間 5分で	1瓶	14:15						

インターバル日数： 14 日　　**基準日：** Day 1　　**最大クール数：**0クール

共通　　【大腸】　　**レジメン名称：**大腸癌ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4			
		投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白								
06	ヘパロック	ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ 療法名:大腸癌ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ療法 ヘパロック: ポート	1筒	14:20						
01	処方	ナウゼリンOD錠10 分3（朝,昼,夕)食前 4日分	3錠	●	●	●	●			
02	処方	炭酸水素ナトリウム（東海製薬） ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg「ｻﾜｲ」 酸化マグネシウム錠500mg｢ﾖｼﾀﾞ」 分3（朝,昼,夕)食後 4日分	1.8g 3錠 3錠	●	●	●	●			
03	処方	デカドロン錠　０．５mg 分2（朝,昼)食後 3日分	16錠		●	●	●			