

血液内科

レジメン名称： (2回目以降 90分) リツキシマブ BS療法

レジメン説明：対象疾患：B細胞性非ホジキンリンパ腫

適用条件：

除外条件：

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴静注(末梢)	危)リツキシマブ 注BS(100, 500mg)	375mg/m2	450mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	アセリオ静注液1000mgバッグ ポララミン注 5mg 療法名：(2回目以降 90分) リツキシマブ BS療法 点滴静注(末梢)： *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0.5袋 1A	10:00						
02	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名：(2回目以降 90分) リツキシマブ BS療法 点滴静注(末梢)： *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1瓶	10:15						
03	点滴静注(末梢)	危)リツキシマブ 注BS(100, 500mg) 【自動計算】生理食塩液 療法名：(2回目以降 90分) リツキシマブ BS療法 点滴静注(末梢)： *点滴速度 100ml/h 投与経路:末梢ルートメイン 1 《混合不可!単独投与すること》	0mg 250mL	10:30						
04	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名：(2回目以降 90分) リツキシマブ BS療法 点滴静注(末梢)： *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1瓶	12:00						

RP	オーダーコメント
03	★R初回投与中及び必要時は心電図を装着 ★最初の30分は100mL/hで点滴し、その後は200mL/hで最後まで点滴する。 <次ページあり>

血液内科

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

レジメン名称 : (2回目以降 90分) リツキシマブ BS療法

RP	オーダーコメント
	★IRの場合, ①R点滴中断②ヒトロコチゾリン酸エステルNa静注液100mg+生食50mL点滴③症状改善後, 症状発現の速度より一段点滴速度を下げR点滴再開④再び症状が発現した場合①から③を繰り返す