

血液内科

レジメン名称 : 【継続・リツキシマブ 90分投与】 Pola+R-CHP療法

レジメン説明 : 対象 : DLBCL

適用条件 : ★発熱性好中球減少症の合併率が高いため、G-CSF製剤を併用する。

除外条件 :

使用する抗がん剤:

| RP | 手技       | 薬剤名称                     | 標準値      | 上限値       |
|----|----------|--------------------------|----------|-----------|
| 03 | 点滴静注(末梢) | 危)リツキシマブ 注BS(100, 500mg) | 375mg/m2 | 450mg/m2  |
| 05 | 点滴静注(末梢) | 危)ポララミン点注30mg, 140mg     | 1.8mg/kg | 1.98mg/kg |
| 08 | 点滴静注(末梢) | 危)トキソリン注(10, 50mg)「NK」   | 50mg/m2  | 55mg/m2   |
| 09 | 点滴静注(末梢) | 危)注射用エンドキサン500mg         | 750mg/m2 | 825mg/m2  |

| RP | 手技                       | 薬剤名称  | 用量/単位        | Day1  | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 |  |  |
|----|--------------------------|---|--------------|-------|------|------|------|------|--|--|
| 01 | 点滴静注(末梢)                 | アセリオ静注液1000mgバッグ<br>ポララミン注 5 mg<br>療法名:【継続・リツキシマブ 90分投与】 Pola+R-CHP療法<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 15分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1                                      | 0.5袋<br>1A   | 10:00 |      |      |      |      |  |  |
| 02 | 点滴静注(末梢)                 | 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)<br>療法名:【継続・リツキシマブ 90分投与】 Pola+R-CHP療法<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 15分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1   | 1瓶           | 10:15 |      |      |      |      |  |  |
| 03 | 点滴静注(末梢)                 | 危)リツキシマブ 注BS(100, 500mg)<br>大塚生食注 (250mL)<br>療法名:【継続・リツキシマブ 90分投与】 Pola+R-CHP療法<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 90分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1<br>混合不可!単独投与すること<br>フィルター禁 | 0mg<br>250mL | 10:30 |      |      |      |      |  |  |
| 04 | 点滴静注(末梢)<br><br><次ページあり> | 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋)<br>療法名:【継続・リツキシマブ 90分投与】 Pola+R-CHP療法<br>点滴静注(末梢):<br>*点滴時間 30分で   | 1瓶           | 12:00 |      |      |      |      |  |  |



インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

血液内科

レジメン名称 : 【継続・リツキシマブ<sup>®</sup> 90分投与】 Pola+R-CHP療法

| RP | 手技 | 薬剤名称                          | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 |  |  |
|----|----|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--|--|
|    |    | *点滴時間 5分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1   |       |      |      |      |      |      |  |  |
| 01 | 処方 | プレドニン錠 5mg<br>分2 (朝, 昼)食後 5日分 | 20錠   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |  |  |

| RP | オーダーコメント   |
|----|--|
| 03 | <p>★Rフィルター禁</p> <p>★R初回投与中及び必要時は心電図を装着</p> <p>★最初の30分は100mL/hで点滴し、その後は200mL/hで最後まで点滴する。</p> <p>★IRの場合、①R点滴中断②ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg+生食50mL点滴③症状改善後、症状発現の速度より一段点滴速度を下げR点滴再開④再び症状が発現した場合①から③を繰り返す</p>                           |
| 05 | <p>★ポラ化<sup>®</sup>投与30分前にコルフェニラミン錠、カナル錠200mg2錠服用する (リツキシマブ<sup>®</sup>と投与日が別になる場合)</p> <p>★ポラ化<sup>®</sup>投与後30分以上、経過観察を行う</p> <p>★ポラ化<sup>®</sup>初回の忍容性があれば2回目以降点滴時間を30分で可</p> <p>★0.2又は0.22<math>\mu</math>mインラインフィルターを使用</p> |