

血液内科

レジメン名称 : 【初回】 Pola+R-CHP療法

レジメン説明 : 対象 : DLBCL

適用条件 : ★発熱性好中球減少症の合併率が高いため、G-CSF製剤を併用する。

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴静注(末梢)	危)リツキマブ注BS(100, 500mg)	375mg/m2	450mg/m2
05	点滴静注(末梢)	危)ポラ化 <sup>レ</sup> -点滴静注30mg, 140mg	1.8mg/kg	1.98mg/kg
08	点滴静注(末梢)	危)トキソリビ <sup>シ</sup> 注(10, 50mg)「NK」	50mg/m2	55mg/m2
09	点滴静注(末梢)	危)注射用エンドキサン500mg	750mg/m2	825mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴静注(末梢)	アセリオ静注液1000mgバッグ ポララミン注5mg 療法名:【初回】Pola+R-CHP療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0.5袋 1A	10:00						
02	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:【初回】Pola+R-CHP療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:15						
03	点滴静注(末梢)	危)リツキマブ注BS(100, 500mg) 大塚生食注(500mL) 療法名:【初回】Pola+R-CHP療法 点滴静注(末梢): *点滴速度 50ml/h 投与経路:末梢ルートメイン1 10倍に希釈 フィルター禁	0mg 337.5mL	10:30						
04	点滴静注(末梢)  <次ページあり>	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:【初回】Pola+R-CHP療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で	1瓶	13:30						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

血液内科

レジメン名称 : 【初回】 Pola+R-CHP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		投与経路:末梢ルートメイン1								
05	点滴静注(末梢)	危)ポラ化 <sup>ン</sup> -点滴静注30mg, 140mg 生理食塩液「ヒカリ」(100mLプラ) 療法名:【初回】Pola+R-CHP療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	14:00						
06	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:【初回】Pola+R-CHP療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	15:30						
07	点滴静注(末梢)	グ <sup>ラ</sup> セ <sup>ト</sup> ロ <sup>ン</sup> 静注液1mg/シリンジ「サリイ」 【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:【初回】Pola+R-CHP療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 1瓶	15:45						
08	点滴静注(末梢)	危)ド <sup>キ</sup> ル <sup>ビ</sup> シ <sup>ン</sup> 注(10, 50mg)「NK」 生理食塩液「ヒカリ」(100mLプラ) 療法名:【初回】Pola+R-CHP療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1瓶	16:00						
09	点滴静注(末梢)	危)注射用エンドキサン500mg 大塚生食注(250mL) 療法名:【初回】Pola+R-CHP療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	16:30						
10	点滴静注(末梢)  <次ページあり>	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:【初回】Pola+R-CHP療法 点滴静注(末梢):	1瓶	18:00						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

血液内科

レジメン名称 : 【初回】 Pola+R-CHP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		*点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1								
01	処方	プレドニン錠 5mg 分2 (朝, 昼)食後 5日分	20錠	●	●	●	●	●		

RP	オーダーコメント
03	Rフィルター禁 初回投与中・必要時は心電図装着 初回, 最初30分は50mL/h, その後30分毎に50mL/hずつ上げ, 最大400mL/hまで可. 2回目以降, 100mL/hで開始. その後30分毎に100mL/hずつ上げ, 最大400mL/hまで可 IRの場合, ①R中断②ヒドコロルゲン100mg+生食50mL点滴③症状改善後, 症状発現の速度より一段
05	★ポラ化 <sup>レ</sup> 投与30分前にクロルフェニミン1錠、カナル錠200mg2錠服用する (リツキマ <sup>ブ</sup> と投与日が別になる場合) ★ポラ化 <sup>レ</sup> 投与後30分以上、経過観察を行う ★0.2又は0.22 $\mu$ mインラインフィルターを使用