

血液内科

レジメン名称 : JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp

レジメン説明 : 対象疾患 ; 急性リンパ性白血病

化学療法中、肝機能障害予防のため、抗真菌薬はキャンディン系薬剤を使用する・ウルソデオキシコール酸を併用する。
肝機能障害出現時は、カルニチン静注、ビタミンB投与を積極的に検討する。

適用条件 : ※最初のサイクルは、d-7~d1の間で髄注を施行。

※メソトレキセート投与中は、PPI・ペニシリン系抗生剤・シプロフロキサシン・ST合剤・NSAIDs・レフルノミドの使用は控える。

★6MP投与量

[36-55歳] 40mg/m²、 [56-65歳] 30mg/m²、 [NUDT15遺伝子 (Cys/Cys)] 10mg/m²
アロプリノール併用時は50%減量。フェブキソスタットは併用禁忌。

★PEG-Asp投与量

[36-65歳] 750IU/m²

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴静注(末梢)	危) オンコビン注射用1mg	1.3mg/m ²	2mg
04	点滴静注(末梢)	オンキヤスパー点滴静注用3750	1000U/m ²	1100U/m ²
01	処方	危)' メソトレキセート錠 2.5	0錠	20錠
03	処方	危)' ロイケリン散 10%	50mg/m ²	55mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注(末梢)	グラセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名: JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路: 末梢ルートメイン 1	1筒 1袋	10:00						
02	点滴静注(末梢)	危) オンコビン注射用1mg 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名: JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で	0mg 1袋	10:15						
	<次ページあり>									

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 10クール

血液内科

レジメン名称 : JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注(末梢)	グレースロン静注液1mgシリンジ「サリ」 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 1袋							
02	点滴静注(末梢)	危)オンコビン注射用1mg 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
03	点滴静注(末梢)	ヒドロコルチゾン酢酸エステルNa静注液100mg 生理食塩液「ヒカリ」 (50mLブーラ) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1管 1瓶							
04	点滴静注(末梢)	オンキヤスパー点滴静注用3750 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0U 1瓶							
05	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1袋							
01	処方	危)'メソトレキセート錠2.5 分1 眼前 4日分 7日おき	0錠		●					
02	処方 <次ページあり>	プレドニン錠5mg	0錠							

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 10クール

血液内科

レジメン名称 : JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴静注(末梢)	グレースロン静注液1mgシリンジ「サリ」 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 1袋	10:00						
02	点滴静注(末梢)	危)オンコビン注射用1mg 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:15						
03	点滴静注(末梢)	ヒドロコルチゾン酢酸エステルNa静注液100mg 生理食塩液「ヒカリ」 (50mLブーラ) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1管 1瓶	10:30						
04	点滴静注(末梢)	オンキヤスパー点滴静注用3750 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0U 1瓶	10:45						
05	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1袋	12:45						
01	処方	危)'メソトレキセート錠2.5 分1 眼前 4日分 7日おき	0錠			●				
02	処方 <次ページあり>	プレドニン錠5mg	0錠							

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 10クール

血液内科

レジメン名称 : JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	点滴静注(末梢)	グレースロン静注液1mgシリンジ「サイ」 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 1袋							
02	点滴静注(末梢)	危)オンコビン注射用1mg 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
03	点滴静注(末梢)	ヒドロコルチゾン酢酸エステルNa静注液100mg 生理食塩液「ヒカリ」 (50mLブーラ) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1管 1瓶							
04	点滴静注(末梢)	オンキヤスパー点滴静注用3750 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0U 1瓶							
05	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1袋							
01	処方	危)'メソトレキセート錠2.5 分1 眼前 4日分 7日おき	0錠				●			
02	処方 <次ページあり>	プレドニン錠5mg	0錠							

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 10クール

血液内科

レジメン名称 : JSCT ALL/MRD2023維持療法M1/M2 ; PEG-Asp

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
		分1 (朝)食後 5日分								
03	処方	危) ロイケリン散 10% 分1 眠前 28日分	50mg	●	●	●	●	●	●	●