

インターバル日数 : 29 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

血液内科

レジメン名称 : JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	中心静脈	グレーストン静注液1mgシリンジ「サイ」 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名: JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 中心静脈注射: *点滴時間 15分で 投与経路: CVルートメイン1: 白	1筒 1袋							
02	中心静脈	危) オンコビン注射用1mg 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名: JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 中心静脈注射: *点滴時間 15分で 投与経路: CVルートメイン1: 白	0mg 1袋							
03	中心静脈	生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名: JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 中心静脈注射: *点滴時間 60分で 投与経路: CVルートメイン1: 白	1瓶							
04	中心静脈	危) ミトキサント注(200, 1000mg) 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名: JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路: CVルートメイン1: 白	0mg 1袋							
05	中心静脈	危) ミトキサント注(200, 1000mg) 大塚生食注 (500mL) 療法名: JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 中心静脈注射: *点滴時間 23.5時間で 投与経路: CVルートメイン1: 白	0mg 500mL							
06	払い出し用	ソルデム3A輸液 (500mL) メイロン静注7% (20mL) 療法名: JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 払い出し用:	1袋 1A							
07	中心静脈 <次ページあり>	ヒドロコルチゾン酢酸エステルNa静注液100mg	1管							

インターバル日数 : 29 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

血液内科

レジメン名称 : JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17				
01	中心静脈	ゲラネトロン静注液1mgシリンジ「サイ」 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 中心静脈注射: *点滴時間 15分で 投与経路:CVルートメイン1:白	1筒 1袋	10:00						
02	中心静脈	危)オンコビン注射用1mg 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 中心静脈注射: *点滴時間 15分で 投与経路:CVルートメイン1:白	0mg 1袋	10:15						
03	中心静脈	生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名:JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 中心静脈注射: *点滴時間 60分で 投与経路:CVルートメイン1:白	1瓶	10:30						
04	中心静脈	危)ミトキサント注(200, 1000mg) 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVルートメイン1:白	0mg 1袋	11:30						
05	中心静脈	危)ミトキサント注(200, 1000mg) 大塚生食注 (500mL) 療法名:JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 中心静脈注射: *点滴時間 23.5時間で 投与経路:CVルートメイン1:白	0mg 500mL	12:00						
06	払い出し用	ソルデム3A輸液 (500mL) メイロン静注7% (20mL) 療法名:JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 払い出し用:	1袋 1A	6回	6回	6回				
07	中心静脈 <次ページあり>	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg	1管		12:15					

インターバル日数 : 29 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

血液内科

レジメン名称 : JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17				
		【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 中心静脈注射: *点滴時間 15分で 投与経路:CVルートメイン1:白	1袋							
08	中心静脈	オンキヤスパー点滴静注用3750 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLプラ) 療法名:JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVルートメイン1:白	0U 1瓶		12:30					
09	処置用	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp 処置用: メソトレキセート終了後のフラッシュ用	1袋		1回					
10	ワンショット静注	ロイコボリン注3mg (1mL) 療法名:JSCT ALL/MRD2023地固め療法C ; PEG-Asp ワンショット静脈注射:	0A		4回	4回				

RP	オーダーコメント
10	メソトレキセート投与開始36時間後から、6時間毎に計8回投与する。