

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

血液内科

レジメン名称 : 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目)

レジメン説明 : 対象疾患 : 再発又は難治性の多発性骨髄腫

【希釈液】

生食または5%ブドウ糖

適用条件 : ケトミド、デキサメタゾンを併用する。

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
04	点滴静注(末梢)	危) エムブリンチ (300mg, 400mg)	10mg/kg	11mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注(末梢)	デキサト注射液 (6.6mg/2mL) [先;デカトリン] 生理食塩液「ヒカリ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名: 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	ポララミン注5mg ファモチジン静注20mg「日新」 生理食塩液「ヒカリ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名: 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1管 1瓶	10:15						
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (100mLﾌﾟﾗ) 療法名: 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:30						
04	点滴静注(末梢)  <次ページあり>	危) エムブリンチ (300mg, 400mg) 大塚生食注 (500mL) 療法名: 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴速度 30ml/h 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 350mL	11:00						



インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

血液内科

レジメン名称 : 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注(末梢)	デキスト注射液 (6.6mg/2mL) [先;デキストン] 生理食塩液「ヒカリ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	ポララミン注 5mg ファモチジン静注20mg「日新」 生理食塩液「ヒカリ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1管 1瓶	10:15						
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (100mLﾌﾟﾗ) 療法名:【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:30						
04	点滴静注(末梢)	危) エムプリシティ (300mg, 400mg) 大塚生食注 (500mL) 療法名:【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴速度 30ml/h 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 350mL	11:00						
05	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	13:40						
01	処方	カロナー錠 200mg 分1 (1日1回) 1日分 ※エムプリシティ投与30~90分前に内服	2錠							
02	処方 <次ページあり>	レナデックス錠4mg	7錠							



インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

血液内科

レジメン名称 : 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴静注(末梢)	デキスト注射液 (6.6mg/2mL) [先;デキスト] 生理食塩液「ヒカリ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	ポララミン注5mg ファモチジン静注20mg「日新」 生理食塩液「ヒカリ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1管 1瓶	10:15						
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (100mLﾌﾟﾗ) 療法名:【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:30						
04	点滴静注(末梢)	危) エムﾌﾟﾘｼﾞﾃｲ (300mg, 400mg) 大塚生食注 (500mL) 療法名:【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴速度 30ml/h 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 350mL	11:00						
05	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	13:40						
01	処方	カロナール錠200mg 分1 (1日1回) 1日分 ※エムﾌﾟﾘｼﾞﾃｲ投与30~90分前に内服	2錠							
02	処方 <次ページあり>	レナデックス錠4mg	7錠							



インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

血液内科

レジメン名称 : 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
01	点滴静注(末梢)	デキサト注射液 (6.6mg/2mL) [先 ; デキサト] 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL <sup>プ</sup> ラ) 療法名 : 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	ポララミン注5mg ファモチジン静注20mg「日新」 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL <sup>プ</sup> ラ) 療法名 : 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1管 1瓶	10:15						
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (100mL <sup>プ</sup> ラ) 療法名 : 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:30						
04	点滴静注(末梢)	危) エムプリシティ (300mg, 400mg) 大塚生食注 (500mL) 療法名 : 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴速度 30ml/h 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 350mL	11:00						
05	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mL <sup>プ</sup> ラ) 療法名 : 【90kg超え】MM ERd療法 (1,2サイクル目) 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	13:40						
01	処方	カロナール錠 200mg 分1 (1日1回) 1日分 ※エムプリシティ投与30~90分前に内服	2錠							
02	処方 <次ページあり>	レナデックス錠4mg	7錠							

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

血液内科

レジメン名称 : 【90kg超え】MM ERd療法 (1, 2サイクル目)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
		分1 (1日1回) 1日分 ※EM7° リンチ投与3~24時間前に内服								
03	処方	レナデックス錠4mg 分1 (1日1回) 1日分 ※EM7° リンチ投与3~24時間前に内服	7錠							
04	処方	カロナール錠200mg 分1 (1日1回) 1日分 ※EM7° リンチ投与30~90分前に内服	2錠							
05	処方	レナデックス錠4mg 分1 (1日1回) 1日分 ※EM7° リンチ投与3~24時間前に内服	7錠							
06	処方	カロナール錠200mg 分1 (1日1回) 1日分 ※EM7° リンチ投与30~90分前に内服	2錠							
07	処方	カロナール錠200mg 分1 (1日1回) 1日分 ※EM7° リンチ投与30~90分前に内服	2錠	●						
08	処方	レナデックス錠4mg 分1 (1日1回) 1日分 ※EM7° リンチ投与3~24時間前に内服	7錠	●						

RP	オーダーコメント
04	<p>★本剤投与3~24時間前までにレナデックス7錠、30~90分前までにカロナール2錠内服</p> <p>★300mg製剤 : 注射用水13mLで溶解する。400mg製剤 : 注射用水17mLで溶解する</p> <p>★初回投与中及び必要時は心電図を装着</p> <p>★投与速度 (最大300mL/hを超えないこと)</p> <p>【初回】 0~30分 : 30mL/h、30~60分 : 60mL/h、60分以降 : 120mL/h</p> <p>【1サイクル目2回目投与】 0~30分 : 180mL/h、30分以降 : 240mL/h</p> <p>【1サイクル目3及び4回目投与】 300mL/h</p> <p>【2サイクル目】 300mL/h</p>