インターバル日数： 8 日　　**基準日：** Day 1　　**最大クール数：**0クール

血液内科　　**レジメン名称：**auto-PBSCT MCVC

レジメン説明：移植：day8
適用条件：
除外条件：

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	中心静脈	危)注射用サイメリン50mg	400mg/m2	440mg/m2
03	中心静脈	危)ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注(50,150,450mg)	300mg/m2	330mg/m2
04	中心静脈	危)ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注100mg「ｻﾝﾄﾞ」	125mg/m2	137.5mg/m2
05	中心静脈	危)ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注100mg「ｻﾝﾄﾞ」	125mg/m2	137.5mg/m2
06	中心静脈	危)ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注100mg「ｻﾝﾄﾞ」	125mg/m2	137.5mg/m2
09	ﾜﾝｼｮｯﾄ静注	ウロミテキサン注400mg (4mL)	20mg/kg	22mg/kg
10	中心静脈	危)注射用エンドキサン500mg	50mg/kg	55mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
01	中心静脈	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ静注液3mgｼﾘﾝｼﾞ「NK」 生理食塩液「ﾋｶﾘ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:auto-PBSCT MCVC 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1筒 1瓶	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
02	中心静脈	危)注射用サイメリン50mg 生理食塩液「ﾋｶﾘ」 (100mLﾌﾟﾗ) 療法名:auto-PBSCT MCVC 中心静脈注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 1瓶	10:15						
03	中心静脈	危)ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注(50,150,450mg) 大塚糖液5% (500mL) 療法名:auto-PBSCT MCVC 中心静脈注射: ＊点滴時間 2時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 1袋	11:15	10:15	10:15	10:15			
04	中心静脈	危)ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注100mg「ｻﾝﾄﾞ」 大塚糖液5% (500mL) 療法名:auto-PBSCT MCVC 中心静脈注射: ＊点滴時間 2時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 1袋	13:15	12:15	12:15	12:15			

インターバル日数： 8 日　　**基準日：** Day 1　　**最大クール数：**0クール

血液内科　　**レジメン名称：**auto-PBSCT MCVC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
05	中心静脈	危)ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注100mg「ｻﾝﾄﾞ」 大塚糖液5%　(500mL) 療法名:auto-PBSCT MCVC 中心静脈注射: ＊点滴時間 2時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 1袋	15:15	14:15	14:15	14:15			
06	中心静脈	危)ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注100mg「ｻﾝﾄﾞ」 大塚糖液5%　(500mL) 療法名:auto-PBSCT MCVC 中心静脈注射: ＊点滴時間 2時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 1袋	17:15	16:15	16:15	16:15			
07	中心静脈	生理食塩液「ﾋｶﾘ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:auto-PBSCT MCVC 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1瓶	19:15	18:15	18:15	18:15			
08	中心静脈	メイロン静注7% (20mL) 大塚生食注　(500mL) 療法名:auto-PBSCT MCVC 中心静脈注射: ＊点滴時間 12時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:青	1A 1袋	2回	2回	2回	2回			
09	ﾜﾝｼｮｯﾄ静注	ウロミテキサン注400mg (4mL) 療法名:auto-PBSCT MCVC ワンショット静脈注射: 投与経路確保 CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:青	0mg					10:15 14:15 18:15	10:15 14:15 18:15	
10	中心静脈	危)注射用エンドキサン500mg 大塚生食注　(500mL) 療法名:auto-PBSCT MCVC 中心静脈注射: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	0mg 1袋					10:15	10:15	
11	中心静脈	生理食塩液「ﾋｶﾘ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:auto-PBSCT MCVC 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で	1瓶					13:15	13:15	

インターバル日数： 8 日　　**基準日：** Day 1　　**最大クール数：**0クール

血液内科　　**レジメン名称：**auto-PBSCT MCVC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
		投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白								
12	中心静脈	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ静注液3mgｼﾘﾝｼﾞ 「NK」 生理食塩液「ﾋｶﾘ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:auto-PBSCT MCVC 中心静脈注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:白	1筒 1瓶					18:00	18:00	
13	中心静脈	メイロン静注7% (20mL) ソルデム3A輸液 (500mL) 療法名:auto-PBSCT MCVC 中心静脈注射: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:CVﾙｰﾄﾒｲﾝ1:青	1A 1袋					6回	6回	

RP	オーダーコメント
09	※通常、メスナとして、シクロホスファミド1日量の40%相当量を1回量とし、1日3回（シクロホスファミド投与時、4時間後、8時間後）投与する。
10	投与中は心電図を装着