

婦人科

レジメン名称 : ⑥ プラチナ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev

レジメン説明 : 対象疾患 : プラチナ抵抗性再発卵巣癌

適用条件 : Neu 1500/mm<sup>3</sup>, Plt 10万/mm<sup>3</sup>以上, Hb 9.0以上Scr1.5mg/dL以下, AST 100U/L, ALT100U/L以下

★パバシマブは初回90分で投与し、忍容性が良好であれば、2回目60分、3回目以降30分で点滴静注することができる。

★パクリタセル投与30分前にレスタシコワ錠 (10) 5T内服

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴静注(末梢)	危)パクリタセル注(30,100mg)「ホスピール	80mg/m <sup>2</sup>	88mg/m <sup>2</sup>
04	点滴静注(末梢)	危)アバシマブ点滴静注用(100,400mg)(限定)	10mg/kg	11mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注(末梢)	デキスト注射液 (6.6mg/2mL) [先 ; デキスト] ファモチジン静注20mg「日新」 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:⑥ プラチナ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1瓶 1管 1瓶	11:00						
02	点滴静注(末梢)	危)パクリタセル注(30,100mg)「ホスピール」 大塚糖液5% (250mL) 療法名:⑥ プラチナ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フィルターを通す	0mg 1袋	11:15						
03	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:⑥ プラチナ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1瓶	12:15						
04	点滴静注(末梢) <次ページあり>	危)アバシマブ点滴静注用(100,400mg)(限定) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブー)	0mg 1瓶	12:20						



婦人科

レジメン名称 : ⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注(末梢)	ﾃﾞｷｼｰﾄ注射液 (6.6mg/2mL) [先 ; ﾃﾞｶﾄﾝ] ﾌﾞﾌﾞﾓﾁｼﾞﾝ静注20mg 「日新」 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1管 1瓶	11:00						
02	点滴静注(末梢)	危)ﾊﾟｸﾘﾀｷﾙ注(30,100mg)「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」 大塚糖液5% (250mL) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1袋	11:15						
03	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	12:15						
04	点滴静注(末梢)	危)ﾌﾞｽﾌﾟﾝ点滴静注用(100,400mg)(限定) 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(100mLﾌﾟﾗ) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1瓶							
05	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
01	処方	ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾌ錠 10mg 頓服:1回分, 医師の指示通り ※ﾊﾟｸﾘﾀｷﾙ投与30分前に服用	5錠							
02	処方 <次ページあり>	ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾌ錠 10mg	5錠	●						



婦人科

レジメン名称 : ⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴静注(末梢)	ﾃﾞｷｼｰﾄ注射液 (6.6mg/2mL) [先 ; ﾃﾞｶﾄﾝ] ﾌﾞﾌﾞﾓﾁｼﾞﾝ静注20mg 「日新」 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1管 1瓶	11:00						
02	点滴静注(末梢)	危)ﾊﾟｸﾘﾀｷﾙ注(30,100mg)「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」 大塚糖液5% (250mL) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1袋	11:15						
03	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	12:15						
04	点滴静注(末梢)	危)ﾌﾞｽﾌﾟﾝ点滴静注用(100,400mg)(限定) 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(100mLﾌﾟﾗ) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1瓶	12:20						
05	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	13:50						
01	処方	ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾌ錠 10mg 頓服:1回分, 医師の指示通り ※ﾊﾟｸﾘﾀｷﾙ投与30分前に服用	5錠							
02	処方 <次ページあり>	ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾌ錠 10mg	5錠							



婦人科

レジメン名称 : ⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
01	点滴静注(末梢)	ﾃﾞｶﾄﾞｰﾝ注射液 (6.6mg/2mL) [先 ; ﾃﾞｶﾄﾞｰﾝ] ﾌｬﾓﾁｼﾞﾝ静注20mg 「日新」 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1管 1瓶	11:00						
02	点滴静注(末梢)	危)ﾊﾟｸﾘﾀｷﾙ注(30,100mg)「ﾎｽﾍﾟｰﾗ」 大塚糖液5% (250mL) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1袋	11:15						
03	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	12:15						
04	点滴静注(末梢)	危)ｱﾊﾞｽﾌﾟﾝ点滴静注用(100,400mg)(限定) 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(100mLﾌﾟﾗ) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1瓶							
05	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:⑥ﾌﾟﾗﾅ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
01	処方	ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾌ錠 10mg 頓服:1回分, 医師の指示通り ※ﾊﾟｸﾘﾀｷﾙ投与30分前に服用	5錠							
02	処方 <次ページあり>	ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾌ錠 10mg	5錠							

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : ⑥ プラチナ抵抗性再発卵巣癌weeklyPTX +Bev

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
		頓服:1回分, 医師の指示通り ※パクリタキセル投与30分前に服用								
03	処方	レスタミンコーワ錠 10mg 頓服:1回分, 医師の指示通り ※パクリタキセル投与30分前に服用	5錠							
04	処方	レスタミンコーワ錠 10mg 頓服:1回分, 医師の指示通り ※パクリタキセル投与30分前に服用	5錠	●						

RP	オーダーコメント
02	★パクリタキセル投与30分前にレスタミンコーワ錠 (10) 5T内服