

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

婦人科

レジメン名称 : ⑭子宮頸癌 TC+パムパロリスマブ+BV(15)療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4			
03	点滴静注(末梢)	パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」 デキスト注射液(6.6mg/2mL)[先;デキスト] デキスト注射液(1.65mg/0.5mL)[先;デキスト] ファモチジン静注20mg「日新」 【ケモ専用】大塚生食注(50mL袋) 療法名:⑭子宮頸癌 TC+パムパロリスマブ+BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶 2A 1管 1瓶	10:45						
04	点滴静注(末梢)	危)パクリタセル注(30,100mg)「ホスピーラ」 大塚糖液5%(500mL) 療法名:⑭子宮頸癌 TC+パムパロリスマブ+BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1袋	11:00						
05	点滴静注(末梢)	危)カルボプラチン注(50,150,450mg)日医 大塚糖液5%(250mL) 療法名:⑭子宮頸癌 TC+パムパロリスマブ+BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	14:00						
06	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL袋) 療法名:⑭子宮頸癌 TC+パムパロリスマブ+BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	15:00						
07	点滴静注(末梢)	危)アパシ点静注用(100,400mg)(限定) 生理食塩液「ヒカリ」(100mLプラ) 療法名:⑭子宮頸癌 TC+パムパロリスマブ+BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 100mL	15:05						
08	点滴静注(末梢) <次ページあり>	【ケモ専用】大塚生食注(50mL袋)	1瓶	16:35						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

婦人科

レジメン名称 : ⑭子宮頸癌 TC+[°]ム[°]ロ[°]ス[°]マ[°] +BV(15)療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4			
		療法名:⑭子宮頸癌 TC+ [°] ム [°] ロ [°] ス [°] マ [°] +BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1								
01	処方	ア [°] レ [°] ビ [°] タ [°] ト [°] カ [°] ブ [°] セ [°] ル [°] セ [°] ット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※カ [°] ホ [°] ブ [°] ラ [°] チ [°] ン投与60-90分前、2・3日目朝食後	1セット	●						
02	処方	レスタミンコーワ錠 10mg 分1 (1日1回) 1日分 ※ハ [°] ク [°] リ [°] タ [°] キ [°] セ [°] ル投与30分前に服用	5錠	●						
03	処方	デカドロン錠 4mg 分1 (朝)食後 3日分	1錠		●	●	●			

RP	オーダーコメント
04	*ハ [°] ク [°] リ [°] タ [°] キ [°] セ [°] ル投与30分前にレスタミンコーワ錠(10)5錠内服
05	カ [°] ホ [°] ブ [°] ラ [°] チ [°] ン投与60-90分前、Day2-3は朝食後にア [°] レ [°] ビ [°] タ [°] ト [°] カ [°] ブ [°] セ [°] ル内服 (Day1 : 125mg、Day2-3 : 80mg内服)
07	*初回投与時は90分かけて点滴静注する。 *忍容性が良好であれば、2回目60分、3回目以降30分で点滴静注することができる。