

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

婦人科

レジメン名称 : 子宮頸癌 TP+[°]ム[°]ロズ[°]マ[°]+BV(15)療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
08	点滴静注(末梢)	危)シ [°] ラ [°] チ [°] 注(10, 25, 50mg)「日医工 大塚生食注 (500mL) 療法名:子宮頸癌 TP+ [°] ム [°] ロズ [°] マ [°] +BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 300mL	17:35						
09	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:子宮頸癌 TP+ [°] ム [°] ロズ [°] マ [°] +BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	19:05						
10	点滴静注(末梢)	危)ア [°] バ [°] ス [°] チ [°] 点滴静注用(100, 400mg)(限定) 生理食塩液「ヒカリ」(100mL [°] ラ) 療法名:子宮頸癌 TP+ [°] ム [°] ロズ [°] マ [°] +BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 100mL	19:10						
11	点滴静注(末梢)	生理食塩液バッグ「フー」(1L) 療法名:子宮頸癌 TP+ [°] ム [°] ロズ [°] マ [°] +BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	20:40						
01	処方	ア [°] レ [°] ビ [°] タ [°] ト [°] カ [°] セ [°] レ [°] ット(3日分/個) (内服全量)1日1回 医師の指示通り ※シ [°] ラ [°] チ [°] 投与60-90分前、2・3日目朝食後	1セット	●						
02	処方	レスタミンコーワ錠 10mg 分1(1日1回)1日分 ※ [°] パ [°] ク [°] リ [°] タ [°] セ [°] ル [°] 投与30分前に服用	5錠	●						
03	処方	デカドロン錠 4mg 分2(朝,昼)食後4日分	2錠		●	●	●	●		

RP	オーダーコメント
05	* [°] パ [°] ク [°] リ [°] タ [°] セ [°] ル [°] 投与30分前にレスタミンコーワ錠(10)5錠内服 <次ページあり>

インターバル日数：21 日

基準日：Day 1

印刷日時：2024-01-15 16:25:48

最大クール数：6クール

婦人科

レジメン名称：子宮頸癌 TP+アブリカタCap125mg+BV(15)療法

RP	オーダーコメント
08	シスプラチン投与の60-90分前にアブリカタCap125mgを内服、Day2-3はアブリカタCap80mg朝食後に内服させる。
10	*初回投与時は90分かけて点滴静注する。 *忍容性が良好であれば、2回目60分、3回目以降30分で点滴静注することができる。