

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

婦人科

レジメン名称 : 子宮頸癌PTX+CDDP+BV(15)療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
04	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:子宮頸癌PTX+CDDP+BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶		10:15					
05	点滴静注(末梢)	危)アパ ^ス 点点滴静注用(100,400mg)(限定) 生理食塩液「ヒカリ」(100mLプラ) 療法名:子宮頸癌PTX+CDDP+BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 100mL		10:20					
06	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:子宮頸癌PTX+CDDP+BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶		11:50					
07	点滴静注(末梢)	危)KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL) 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 生理食塩液バッグ「フー」(1L) 療法名:子宮頸癌PTX+CDDP+BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1KT 1A 1袋		11:55					
08	点滴静注(末梢)	パロセト ^ン 静注0.75mg/5mL「タイホ」 デキ ^ト 注射液(6.6mg/2mL)[先;デカ ^ト] デキ ^ト 注射液(1.65mg/0.5mL)[先;デカ ^ト] 【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:子宮頸癌PTX+CDDP+BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶 1A 1瓶		14:55					
09	点滴静注(末梢) <次ページあり>	20%マンニトール注射液(300mL) 療法名:子宮頸癌PTX+CDDP+BV(15)療法 点滴静注(末梢):	1袋		15:10					

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

婦人科

レジメン名称 : 子宮頸癌PTX+CDDP+BV (15)療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター禁							
10	点滴静注(末梢)	危)シス [°] ラチン注(10, 25, 50mg)「日医工 大塚生食注 (500mL) 療法名:子宮頸癌PTX+CDDP+BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 300mL		15:40				
11	点滴静注(末梢)	生理食塩液バッグ「フー」 (1L) 療法名:子宮頸癌PTX+CDDP+BV(15)療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋		17:10				
01	処方	レスタミンコーワ錠 10mg 分1 (1日1回) 1日分 ※ [°] パ [°] ク [°] タキセル投与30分前に服用	5錠	●					
02	処方	ア [°] レ [°] ビ [°] タ [°] ト [°] カ [°] プ [°] セルセット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※Day2シス [°] ラチン投与60-90分前、3・4日目朝食後	1セット		●				
03	処方	デカドロン錠 4mg 分2 (朝, 昼)食後 4日分 ※Day3~6で内服	2錠			●	●	●	●

RP	オーダーコメント
02	* [°] パ [°] ク [°] タキセル投与30分前にレスタミンコーワ錠(10)5錠内服
05	*初回投与時は90分かけて点滴静注する。 *ア [°] バ [°] ス [°] ンのinfusion reactionが生じなければ、2サイクル目は60分、3回目以降30分まで投与時間を短縮可
10	*Day2シス [°] ラチン投与60-90分前、Day3-4は朝食後にア [°] レ [°] ビ [°] タ [°] ト [°] Cap内服 (Day2 : 125mg、Day3-4 : 80mg内服))*day3-6はデ [°] カ [°] ト [°] ン錠 (0.5) 16錠分2で内服