

婦人科

レジメン名称 : ⑧卵巣癌^ホ ソム化^トキシル^ビシ^ン+CBDCA+Bev

レジメン説明 : 対象疾患 : 卵巣癌
 治療開始前は、心エコーを実施し心機能を確認すること
 ドキシルは総投与量500mg/m²を超えないこと

★効果・毒性によりBev維持療法で継続。

適用条件 : 白血球数3000/mm³、好中球数1500/mm³、血小板数70000/mm³以上、血清^クアチ^ン1.2mg/dL以下、AST100U/L、ALT100U/L以下

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴静注(末梢)	危)ドキシル注20mg(限定)	30mg/m ²	89mg
04	点滴静注(末梢)	危)カルボ ^プ ラチ ^ン 注(50, 150, 450mg) 日医	5(AUC)	750mg
06	点滴静注(末梢)	危)アバ ^ス チ ^ン 点滴静注用(100, 400mg)(限定)	10mg/kg	11mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注(末梢)	グ ^ラ セ ^ト ロ ^ン 静注液1mgシリンジ「サ ^イ 」 テ ^キ サ ^ト 注射液(1.65mg/0.5mL)[先;テ ^カ ト ^ロ ン] 光糖液5%(50mL) 療法名:⑧卵巣癌 ^ホ ソム化 ^ト キシル ^ビ シ ^ン +CBDCA+Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 2A 1瓶	10:30						
02	点滴静注(末梢)	危)ドキシル注20mg(限定) 大塚糖液5%(250mL) 療法名:⑧卵巣癌 ^ホ ソム化 ^ト キシル ^ビ シ ^ン +CBDCA+Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1 【禁】フィルターを通さない	0mg 1袋	10:45						
03	点滴静注(末梢)	光糖液5%(50mL) 療法名:⑧卵巣癌 ^ホ ソム化 ^ト キシル ^ビ シ ^ン +CBDCA+Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	12:15						
04	点滴静注(末梢) <次ページあり>	危)カルボ ^プ ラチ ^ン 注(50, 150, 450mg) 日医	0mg	12:20						

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

婦人科

レジメン名称 : ⑧卵巣癌リポソーム化ドキシルビシン+CBDCA+Bev

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
		*点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1								
07	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:⑧卵巣癌リポソーム化ドキシルビシン+CBDCA+Bev 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	11:35						
01	処方	アプレミタムカプセルセット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※ドキシル投与60-90分前、2・3日目朝食後	1セット							
02	処方	デカドロン錠 4mg 分1(朝)食後 3日分	1錠							

RP	オーダーコメント
02	★注意事項: 投与速度は1mg/分を超えないこと。 ★ドキシル90mg以上の場合は、5%糖液500mLに希釈すること。
06	infusion reactionが生じなければ、2回目は60分、3回目以降は30分まで投与時間を短縮可能。