

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : ②子宮体癌^へムブ^ロリス^マブ^ブ (3w) +レンハ^チブ^ブ

レジメン説明 : * 1回200mgを3週間隔で投与。

適用条件 : 対象疾患 : がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発子宮体癌

慎重投与 : 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のある患者。間質性肺炎のある患者又は既往歴のある患者。

★ I R出現時は適切な処置を行うとともに、次回から抗ヒスタミン薬やステロイド^ドの使用を検討する。レビ^マは1日1回20mgを経口投与する(患者の状態により適宜増減する。)※レビ^マは別に処方する。

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	危)キイトル ^ダ 静注100mg(限定)	200mg	200mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	危)キイトル ^ダ 静注100mg(限定) 生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 療法名:②子宮体癌 ^へ ムブ ^ロ リス ^マ ブ ^ブ (3w) +レンハ ^チ ブ ^ブ 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:②子宮体癌 ^へ ムブ ^ロ リス ^マ ブ ^ブ (3w) +レンハ ^チ ブ ^ブ 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:30						