

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 腎癌ニボルマブ療法(2週毎) +カボザンチブ療法

レジメン説明 : 対象疾患 : 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

\* 1回 240mgを2週間隔で投与する

※カボザンチブ併用(1日1回40mg 適宜増減可)

慎重投与 : 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のある患者間質性肺炎のある患者又はその既往歴のある患者

適用条件 : 白血球数2000/mm<sup>3</sup>, 好中球数1500/mm<sup>3</sup>, 血小板数100000/mm<sup>3</sup>, ヘモグロビン9.0g/dL以上、血清クレアチニン2.0mg/dL以下、AST100U/L、ALT100U/L以下

インフュージョンリアクション出現時は適切な処置を行うとともに、次回から抗ヒスタミン薬やステロイドの使用を検討する。

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	危) オプジーボ点滴静注120mg(限定)	240mg	240mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	危) オプジーボ点滴静注120mg(限定) 生理食塩液「ヒカリ」(50mLブヲ) 療法名:腎癌ニボルマブ療法(2週毎) +カボザンチブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(50mLブヲ) 療法名:腎癌ニボルマブ療法(2週毎) +カボザンチブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:30						