

インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 腎細胞癌^{ペムボリスマブ} (6週毎)+アキシチニブ療法

レジメン説明 : * 1回400mgを6週間隔で投与。

対象疾患 : 化学療法未治療の局所進行性または転移性腎細胞

慎重投与 : 添付文書参照

適用条件 :

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	危)キイトルーダ ^{静注} (20, 100mg)(限定)	400mg	400mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	危)キイトルーダ ^{静注} (20, 100mg)(限定) 生理食塩液「ヒカリ」(100mL ^{フラ}) 療法名:腎細胞癌 ^{ペムボリスマブ} (6週毎)+アキシチニブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(50mL ^{フラ}) 療法名:腎細胞癌 ^{ペムボリスマブ} (6週毎)+アキシチニブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:30						

RP	オーダーコメント
01	アキシチニブ併用 (1回5mgを1日2回経口投与する。患者の状態により適宜増減するが、1回10mg、1日2回まで増量可。)