

泌尿器科

レジメン名称 : 膀胱癌M-VAC療法

レジメン説明 : 対象疾患 : 転移性膀胱癌

適用条件 : 白血球数3000/mm³、好中球数1500/mm³、血小板数70000/mm³以上、血清クレアチニン1.2mg/dL以下、AST100U/L、ALT100U/L以下

除外条件 :

使用する抗がん剤 :

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	危)メトキシート注(5, 50mg)	30mg/m ²	33mg/m ²
04	点滴静注(末梢)	危)エクザール注射用10mg	3mg/m ²	3.3mg/m ²
05	点滴静注(末梢)	危)トキソリン注(10, 50mg)「NK」	30mg/m ²	33mg/m ²
08	点滴静注(末梢)	危)シプロラチン注(10, 25, 50mg)「マルコ	70mg/m ²	77mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 危)メトキシート注(5, 50mg) 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 0mg	10:30						
02	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶	11:00						
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホ ^ウ 」 デキアト注射液(6.6mg/2mL)[先;デカト ^ン] デキアト注射液(1.65mg/0.5mL)[先;デカト ^ン] 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 1瓶 1瓶 2A		10:00					
04	点滴静注(末梢) <次ページあり>	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 危)エクザール注射用10mg 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢):	1瓶 0mg		10:30					

泌尿器科

レジメン名称 : 膀胱癌M-VAC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		*点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り								
05	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 危)ドキシルビ ^ン 注(10, 50mg)「NK」 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 0mg		11:00					
06	点滴静注(末梢)	生理食塩液バッグ「フ ^ー 」(1L) 危)KCL注20mEqキ ^{ット} 「テル ^ト 」(20mL) 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:医師の指示通り	1袋 1KT 1A		11:30					
07	点滴静注(末梢)	20%マンニ ^{トール} 注射液(300mL) 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り フィルター禁	1袋		14:30					
08	点滴静注(末梢)	大塚生食注 (500mL) 危)シ ^プ ラ ^ン 注(10, 25, 50mg)「マル ^ロ 」 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:医師の指示通り	300mL 0mg		15:00					
09	点滴静注(末梢)	生理食塩液バッグ「フ ^ー 」(1L) 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:医師の指示通り	1袋		16:30					
10	点滴静注(末梢) <次ページあり>	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) デ ^キ ア ^ト 注射液 (1.65mg/0.5mL) [先 ; デ ^キ ア ^ト]	1瓶 2A							

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

泌尿器科

レジメン名称 : 膀胱癌M-VAC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 危)ミノレキソト注(5, 50mg) 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 0mg							
02	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶							
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) パロセトン静注0.75mg/5mL「タイホ」 デキスト注射液(6.6mg/2mL)[先;デカトン] デキスト注射液(1.65mg/0.5mL)[先;デカトン] 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 1瓶 1瓶 2A							
04	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 危)エクザール注射液10mg 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 0mg							
05	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 危)トキシルビン注(10, 50mg)「NK」 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 0mg							
06	点滴静注(末梢) <次ページあり>	生理食塩液バッグ「フー」(1L) 危)KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL) 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	1袋 1KT 1A							

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

泌尿器科

レジメン名称 : 膀胱癌M-VAC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 危)ミノレキソト注(5, 50mg) 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 0mg	10:30						
02	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶	11:30						
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) パロセトン静注0.75mg/5mL「タイ ^ホ 」 デキスト注射液(6.6mg/2mL)[先;デ ^カ ト ^ン] デキスト注射液(1.65mg/0.5mL)[先;デ ^カ ト ^ン] 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 1瓶 1瓶 2A							
04	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 危)エクザール注射用10mg 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 0mg	11:00						
05	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 危)トキシルビソ注(10, 50mg)「NK」 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 0mg							
06	点滴静注(末梢) <次ページあり>	生理食塩液バッグ「フ ^リ 」(1L) 危)KCL注20mEqキット「テル ^モ 」(20mL) 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	1袋 1KT 1A							

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

泌尿器科

レジメン名称 : 膀胱癌M-VAC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
01	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 危)ミノレキソト注(5, 50mg) 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 0mg	10:30						
02	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶	11:30						
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) パロセトン静注0.75mg/5mL「タイ ^ホ 」 デキスト注射液(6.6mg/2mL)[先;デ ^カ ト ^ン] デキスト注射液(1.65mg/0.5mL)[先;デ ^カ ト ^ン] 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 1瓶 1瓶 2A							
04	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 危)エクザール注射用10mg 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 0mg	11:00						
05	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLブ ^ラ) 危)トキシルビ ^ン 注(10, 50mg)「NK」 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 0mg							
06	点滴静注(末梢) <次ページあり>	生理食塩液バッグ「フ ^リ 」(1L) 危)KCL注20mEqキット「テル ^モ 」(20mL) 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	1袋 1KT 1A							

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

泌尿器科

レジメン名称 : 膀胱癌M-VAC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
		療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:医師の指示通り								
07	点滴静注(末梢)	20%マンニトール注射液(300mL) 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り フィルター禁	1袋							
08	点滴静注(末梢)	大塚生食注 (500mL) 危)シブ ラン注(10, 25, 50mg) 「マルコ 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:医師の指示通り	300mL 0mg							
09	点滴静注(末梢)	生理食塩液バッグ「フー」 (1L) 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:医師の指示通り	1袋							
10	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) デキアト注射液 (1.65mg/0.5mL) [先 ; デカロン] 療法名:膀胱癌M-VAC療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:医師の指示通り	1瓶 2A	10:00						
01	処方	アプレ タトカ セット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※2日目シブ ラン投与60-90分前3・4日目朝食後	1セット							
02	処方	デカドロン錠 4mg 分2 (朝, 昼)食後 3日分	2錠							