

泌尿器科

レジメン名称 : 前立腺癌 ニュベクオ/トセキセル併用療法

レジメン説明 : 対象疾患 : 遠隔転移を有する前立腺癌

※ (ダロラミド) ニュベクオは限定採用薬のため別に処方。

※処方時は600mg/body 1日2回食後に服用

適用条件 : ・ADT (アンドロゲン除去療法 ; GnRHアナログ/アンタゴニスト、精巣摘除術) 12週以内に本治療を開始。

・トセキセルはニュベクオ開始6週間以内にサイクル1を開始。

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴静注(末梢)	危)トセキセル点滴静注ニプロ(20, 80mg)	75mg/m2	82.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	デキソト注射液 (6.6mg/2mL) [先 ; デキサメト] 生理食塩液「ヒカリ」 (50mLブヲ) 療法名:前立腺癌 ニュベクオ/トセキセル併用療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	危)トセキセル点滴静注ニプロ(20, 80mg) 大塚糖液5% (250mL) 療法名:前立腺癌 ニュベクオ/トセキセル併用療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:15						
03	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mLブヲ) 療法名:前立腺癌 ニュベクオ/トセキセル併用療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	11:15						