

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 4クール

共通

レジメン名称 : MSI - High結腸・直腸=ホ^レルマブ[®]+化^レリマブ[®]療法

レジメン説明 : 対象疾患 : がん化学療法後に増悪した治癒切除不能のMSI-High結腸・直腸癌

4コース終了後、効果が認められた場合は=ホ^レルマブ[®]を継続する
慎重投与 : 添付文書参照適用条件 : 白血球数2000/mm³, 好中球数1500/mm³, 血小板数100000/mm³, ヘモグロビン9.0g/dL以上、血清クレアチニン2.0mg/dL以下、AST100U/L、ALT100U/L以下
高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)が確認されていること。1つ以上の化学療法歴があること。
インフュージョンリアクション出現時は適切な処置を行うとともに、次回から抗ヒスタミン薬やステロイドの使用を検討する。

除外条件 : フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカン塩酸塩水和物による治療歴のない患者

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	危) オ ^レ シ ^ホ 点滴静注120mg(限定)	240mg	240mg
03	点滴静注(末梢)	危)ヤ ^ホ イ点滴静注液50mg(限定)	1mg/kg	1.1mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	危) オ ^レ シ ^ホ 点滴静注120mg(限定) 生理食塩液「ヒカリ」(50mL ^プ ラ) 療法名:MSI - High結腸・直腸=ホ ^レ ルマブ [®] +化 ^レ リマブ [®] 療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(50mL ^プ ラ) 療法名:MSI - High結腸・直腸=ホ ^レ ルマブ [®] +化 ^レ リマブ [®] 療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:30						
03	点滴静注(末梢)	危)ヤ ^ホ イ点滴静注液50mg(限定) 生理食塩液「ヒカリ」(50mL ^プ ラ) 療法名:MSI - High結腸・直腸=ホ ^レ ルマブ [®] +化 ^レ リマブ [®] 療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	11:00						
04	点滴静注(末梢) <次ページあり>	生理食塩液「ヒカリ」(50mL ^プ ラ)	1瓶	11:30						

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 4クール

共通

レジメン名称 : MSI - High結腸・直腸ニボルマブ+化^レリムマブ^ブ療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
		療法名:MSI - High結腸・直腸ニボルマブ+化 ^レ リムマブ ^ブ 療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1								

RP	オーダーコメント
01	★先にオブジーボを投与し、投与完了後30分以上間隔を空けてヤホイを投与する。