

共通

レジメン名称 : MSI-High固形癌Pembrolizumab 【3週毎】

レジメン説明 : 対象疾患 : がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌

* 1回200mgを3週間隔で投与。

慎重投与 : 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のある患者
間質性肺炎のある患者又はその既往歴のある患者

適用条件 : MSI-Highが確認された進行・再発の固形癌患者に投与すること

除外条件 : 結腸・直腸癌の場合、他の5-FU、1-OHP、CPT-11による治療歴のない患者における有効性は確立していない。

結腸・直腸癌以外の固形癌の場合、一次治療における有効性及び安全性は確立していない。また、二次治療において標準的な治療が可能な場合には、これらの治療を優先すること。

他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	危)キイトルダ [®] 静注(20, 100mg) (限定)	200mg	200mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	危)キイトルダ [®] 静注(20, 100mg) (限定) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mL [®] ラ) 療法名:MSI-High固形癌Pembrolizumab 【3週毎】 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (50mL [®] ラ) 療法名:MSI-High固形癌Pembrolizumab 【3週毎】 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:30						