インターバル日数： 7 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

腫瘍内科　　レジメン名称：神経内分泌腫瘍　weeklyストレプトゾシン

レジメン説明：対象：膵神経内分泌腫瘍

★1回1000mg/m2で投与を開始し、12週までの忍容性が良好な場合には、1回1250mg/m2に増量することできる。さらに、18週までに忍容性が認められる場合には、最大1回1500mg/m2までに増量することができる。

適用条件：好中球 1500/mm3以上、血小板 10万/mm3以上、総ビリルビン 3mg/dl以下、ASTおよびＡＬＴ 100U/L以下、Cre 1.5mg/dl以下、BUN 30mg/dl以下

除外条件：

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴静注(末梢)	ザノサー点滴静注用1g	1000mg/m2	1500mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	大塚生食注　(500mL) 療法名:神経内分泌腫瘍　weeklyストレプトゾシン 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン１	1袋	11:00						
02	点滴静注(末梢)	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎｳ」 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 (6.6mg/2mL) [先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ] ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 (1.65mg/0.5mL) [先；ﾃﾞｶﾄﾛﾝ] 生理食塩液「ﾋｶﾘ」 (50mLﾌﾟﾗ) 療法名:神経内分泌腫瘍　weeklyストレプトゾシン 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 15分で 投与経路: 末梢側管1	1瓶 1瓶 2A 1瓶	11:00						
03	点滴静注(末梢)	ザノサー点滴静注用1g 生理食塩液「ﾋｶﾘ」 (100mLﾌﾟﾗ) 療法名:神経内分泌腫瘍　weeklyストレプトゾシン 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 30分で 投与経路: 末梢側管1	0mg 1瓶	11:15						
04	点滴静注(末梢) ＜次ページあり＞	大塚生食注　(250mL) 療法名:神経内分泌腫瘍　weeklyストレプトゾシン 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 1時間で	1袋	11:45						

印刷日時： 2023-04-18 15:16:55

インターバル日数： 7 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

腫瘍内科　　レジメン名称：神経内分泌腫瘍　weeklyストレプトゾシン

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
		投与経路: 末梢側管1								