

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 【ア行】 レジメン名称 : (継続) エジヤ任注

レジメン説明 : 対象疾患 : 寒冷凝集素症

初回投与後は1週間後に投与。それ以降は2週間隔で投与

適用条件 : (注意①) 体重によって投与速度が異なります。

☆Bw70kg未満 →250mL/hr

☆Bw70kg以上 →500mL/hr

(注意②) 体重によって投与量が異なります。

★Bw75kg未満 →6.5 g 投与

★Bw75kg以上 →7.5 g 投与

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	エジヤイモ点滴静注1.1g【限】	6.5mg	7.5mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	エジヤイモ点滴静注1.1g【限】 大塚生食注 (500mL) 療法名:(継続) エジヤ任注 点滴静注(末梢): *点滴時間 2時間で 投与経路:医師の指示通り フィルターを通す	0mg 500mL	10:00						

RP	オーダーコメント
01	(注意①) 体重によって投与速度が異なります。 ☆Bw70kg未満 →250mL/hr ☆Bw70kg以上 →500mL/hr (注意②) 体重によって投与量が異なります。 ★Bw75kg未満 →6.5 g 投与 ★Bw75kg以上 →7.5 g 投与