インターバル日数： 78 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

消化器内科　　レジメン名称：ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法

レジメン説明：対象疾患：中等症から重症の活動期ｸﾛｰﾝ病の寛解導入期

★効果減弱時には1200mgを1回再投与できる。
★1200mgを投与し、再度1200mg投与を行う場合には16週以上、間隔を空ける。
★1200mgを3回以上投与した場合の有効性等を評価していないため、漫然と投与を行わない。

適用条件：
除外条件：

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	スキリージ点滴静注600mg	600mg	600mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注(末梢)	スキリージ点滴静注600mg 大塚糖液5%　(250mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン１ フイルターを通す	0mg 1袋	10:00						
02	点滴静注(末梢)	光糖液5%　(50mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン１	1瓶	11:00						
	＜次ページあり＞									

インターバル日数： 78 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

消化器内科　　レジメン名称：ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注(末梢)	スキリージ点滴静注600mg 大塚糖液5%　(250mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン１ フイルターを通す	0mg 1袋							
02	点滴静注(末梢)	光糖液5%　(50mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン１	1瓶							
	＜次ページあり＞									

インターバル日数： 78 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

消化器内科　　レジメン名称：ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴静注(末梢)	スキリージ点滴静注600mg 大塚糖液5%　(250mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン１ フイルターを通す	0mg 1袋							
02	点滴静注(末梢)	光糖液5%　(50mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン１	1瓶							
	＜次ページあり＞									

インターバル日数： 78 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

消化器内科　　レジメン名称：ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	点滴静注(末梢)	スキリージ点滴静注600mg 大塚糖液5%　(250mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン１ フイルターを通す	0mg 1袋							
02	点滴静注(末梢)	光糖液5%　(50mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン１	1瓶							
	＜次ページあり＞									

インターバル日数： 78 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

消化器内科　　レジメン名称：ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33	Day34	Day35
01	点滴静注(末梢)	スキリージ点滴静注600mg 大塚糖液5%　(250mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン１ フイルターを通す	0mg 1袋	10:00						
02	点滴静注(末梢)	光糖液5%　(50mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン１	1瓶	11:00						
	＜次ページあり＞									

インターバル日数： 78 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

消化器内科　　レジメン名称：ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day36	Day37	Day38	Day39	Day40	Day41	Day42
01	点滴静注(末梢)	スキリージ点滴静注600mg 大塚糖液5%　(250mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン１ フイルターを通す	0mg 1袋							
02	点滴静注(末梢)	光糖液5%　(50mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン１	1瓶							
	＜次ページあり＞									

インターバル日数： 78 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

消化器内科　　レジメン名称：ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day43	Day44	Day45	Day46	Day47	Day48	Day49
01	点滴静注(末梢)	スキリージ点滴静注600mg 大塚糖液5%　(250mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン１ フイルターを通す	0mg 1袋							
02	点滴静注(末梢)	光糖液5%　(50mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン１	1瓶							
	＜次ページあり＞									

インターバル日数： 78 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

消化器内科　　レジメン名称：ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day50	Day51	Day52	Day53	Day54	Day55	Day56
01	点滴静注(末梢)	スキリージ点滴静注600mg 大塚糖液5%　(250mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン１ フイルターを通す	0mg 1袋							
02	点滴静注(末梢)	光糖液5%　(50mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン１	1瓶							
	＜次ページあり＞									

インターバル日数： 78 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

消化器内科　　レジメン名称：ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day57						
01	点滴静注(末梢)	スキリージ点滴静注600mg 大塚糖液5%　(250mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン１ フイルターを通す	0mg 1袋	10:00						
02	点滴静注(末梢)	光糖液5%　(50mL) 療法名:ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ （ｽｷﾘｰｼﾞ） 療法 点滴静注(末梢): ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン１	1瓶	11:00						