

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 8クール

感染症内科

レジメン名称 : (カポジ肉腫) ドキシル療法

レジメン説明 : 対象疾患 : HIV関連カポジ肉腫

投与中は心電図モニターを使用する。
 治療開始前は、心エコーを実施し心機能を確認すること
 総投与量500mg/m²までとする

適用条件 : 減量・中止基準

Neu<1500またはPLT<75000で休薬

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴静注(末梢)	危)ドキシル注20mg(限定)	20mg/m2	22mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	グレースロン静注液1mgシリンジ「サリ」 光糖液5% (50mL) 療法名:(カポジ肉腫) ドキシル療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 1瓶	10:30						
02	点滴静注(末梢)	危)ドキシル注20mg(限定) 大塚糖液5% (250mL) 療法名:(カポジ肉腫) ドキシル療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1 【禁】フィルターを通さない	0mg 1袋	10:45						
03	点滴静注(末梢)	大塚糖液5% (100mL) 療法名:(カポジ肉腫) ドキシル療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1KT	12:15						

RP	オーダーコメント
02	・総投与量は500mg/m ² まで ・投与時は心電図モニター使用 <次ページあり>

インターバル日数：21 日

基準日：Day 1

印刷日時：2023-11-24 14:20:44

最大クール数：8クール

感染症内科

レジメン名称：（カポジ肉腫）ドキシル療法

RP	オーダーコメント
	<ul style="list-style-type: none">・投与速度は1mg/分を超えないこと・手足症候群予防のため手足のクーリングをする