パス名称 ： 腎摘術（補水）

日付		1日目	2日目	3日目			4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目
入外区分		入院	入院	入院			入院	入院	入院	入院	入院	入院	入院	入院
イベント		入院日	手術前1日目	手術前	手術中	手術後	手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目	手術後4日目	手術後5日目	手術後6日目	手術後7日目	退院日
ステップ		入院～手術2日前	手術前日	手術日			術後1～5日目					術後6～8日目		退院日
アウトカム		手術についての説明を受け、手術前の処置がスムーズに受けられる	→	異常が早期に発見対処される			食事摂取の方法や量を理解できる					食事摂取の方法や量を理解できる		＜退院基準＞
				バイタルサインが安定している			イレウス症状がない							食事が半分以上摂取可能
							排尿障害がみられない							安心して退院を迎えられる
														発熱がない
検査	検体検査	検査				帰室後 採血	時間外至急採血						採血	
	生理検査													
	放射線検査					腹部X-rayポータブル								
治療	処方		*眠前希望時：眠剤内服											*退院処方
	注射					ソルデム3A 側管から ファモチジン ivx1	ソルデム3A	→	ソルデム3A					
				セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ①（搬入時持参、術中は3時間毎にdiv）										
				セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ②（搬入時持参、術中は3時間毎にdiv）										
				セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ③（搬入時持参、術中は3時間毎にdiv）										

パス名称 ： 腎摘術（補水）

日付		1日目	2日目	3日目			4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目
入外区分		入院	入院	入院			入院	入院	入院	入院	入院	入院	入院	入院
イベント		入院日	手術前1日目	手術前	手術中	手術後	手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目	手術後4日目	手術後5日目	手術後6日目	手術後7日目	退院日
				セファゾリンNa点滴静注用1gバック③（搬入時持参、術中は3時間毎にdiv）										
	処置		*膳処置・入浴	弾性ストッキング		フットポンプ	*フットポンプ抜去（歩行したら）		*Epi抜去					
						*酸素：主治医・麻酔科医の指示確認								
輸血				T&S										
▽ 食事	朝	入院時設定	入院時設定	食止め			食止め	入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定
	昼	入院時設定	入院時設定	食止め			入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定
	夕	入院時設定	入院時設定	食止め			入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定	入院時設定
▽ 活動		院内フリー	→	→		ベッド上安静・体位変換可		院内フリー	→	→	→	→	→	→
▽ 看護Eプラン		術前オリエンテーション	→				体拭きをします	体拭きをします	体拭きをします	指示によりシャワー浴				退院後の生活について説明
		入院時オリエンテーション												
文書														退院療養計画書
▽ フリー		*術前検査項目 70歳以上循環器受診	*麻酔科受診（月曜OP時は前金曜日）				*内服開始確認							*次回外来予定日
		*内服薬 確認 *バイアスピリン、ワーファリンなどあれば確認 *アレルギー確認												
バリアンス														
▽ テンプレート		NSMC_Caprini スコア DVT/PE リスク評価と予防法の選択 ver.3.1												